

## 무사마귀 Molluscum Contagiosum

무사마귀는 포스 바이러스로 걸리는 피부 감염이며, 피부 어디든 생길 수 있습니다. 어린이에게서 아주 흔합니다. 성인에게서는 덜 흔하며, 대개 성적 접촉으로 확산됩니다. 이 경우, 감염은 대개 배, 음부, 엉덩이, 넓적다리에 발생합니다.

무사마귀는 치료 가능하며, 종종 저절로 없어집니다. 브리티시 컬럼비아주에서 흔한 감염입니다.

### 원인 Causes

무사마귀는 질, 구강, 항문을 통한 성적 접촉으로 전염될 수 있습니다. 여기에는 삽입 성교는 물론 피부 대 피부 접촉이 있는 성활동도 포함됩니다. 이 바이러스는 옷, 수건 또는 장난감 같은 표면에서도 살 수 있습니다. 무사마귀가 있는 부위를 긁거나 면도하면 전염될 수 있습니다. 무사마귀가 있으면 증상이 없어도 다른 사람들에게 옮길 수 있습니다.

### 증상 Symptoms

무사마귀는 바이러스 접촉 후 2 주에서 6 개월 사이에 나타날 가능성이 가장 큽니다. 무사마귀는 처음에는 아프지 않은 작은 혹이다가 여러 주에 걸쳐 더 커지면서 딱딱하게 돌은 희고 분홍빛인, 가운데가 살짝 패인 혹이 됩니다.

### 검사 및 진단 Tests and Diagnosis

무사마귀 검사와 진단은 임상 검사로 합니다. 의료 제공자가 혹을 살펴보고 무엇인지 알아냅니다. 증상이 있으면 무사마귀 검사를 받는 것이 가장 좋습니다.

### 치료 Treatment

무사마귀 치료 여부는 본인이 선택할 수 있습니다. 대부분 경우, 혹들은 치료 없이 6 개월 안에 사라지지만, 치료하면 더 빨리 사라지기도 합니다. 무사마귀는 의료 제공자가 치료할 수 있으며, 종종 한 번만 치료하면 됩니다. 무슨 치료 옵션이 가장 좋은지 의료 제공자와 상의하세요.

### 성관계 파트너 Sexual Partners

무사마귀를 현재의 성관계 파트너에게 얘기해줄지는 본인의 선택입니다. 파트너에게 말하면 파트너는 알고 선택할 수 있습니다. 그러나 파트너에게 말하고 싶지 않거나 말하는 것이 불안할 수도 있습니다. 자신에게 가장 좋은 결정을 해야 합니다.

현재의 파트너는 무사마귀 여부를 스스로 정기 확인하고 증상이 있으면 의료 제공자를 방문하면 됩니다. 무사마귀 혹은 사라지면 바이러스가 파트너에게 전염될 가능성이 적습니다.

### 합병증 Complications

무사마귀는 대개 다른 건강 문제를 일으키지 않습니다. 때로는 혹은 따끔거리고, 빨개지고, 감염될 수 있습니다. 그러면 의료 제공자를 만나 흉터 방지를 위해 항생제가 필요한지 알아보세요. 심각한 면역 문제가 있는 일부 사람들은 치료를 받아도 무사마귀가 얼굴에 나타나 숫자가 늘기도 합니다.

### 예방 Prevention

성 매개 감염(STI) 검사를 정기적으로 받는 것이 좋습니다. 성관계 파트너가 새로 생기거나 여러 사람과 교제하는 경우에는 특히 그렇습니다. 파트너와 더 안전한 성관계에 관해 대화하면 상대방이 기대하는 것을 서로 확실히 알게 됩니다. 콘돔은 본인이 괜찮다면 아주 좋습니다.

### 정보와 자료 Resources

HealthLink BC – 여러 언어로 제공되는 무사마귀 관련 정보

<https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/molluscum-contagiosum>

SmartSexResource – 무사마귀가 걱정되거나 불안한 경우

<https://smartsexresource.com/topics/worry-and-anxiety>

TransCareBC – 성별을 확증하는 성 및 생식 건강 정보

<http://www.phsa.ca/transcarebc/care-support/access-care/sexual-hlth>