

## Lymphogranulome vénérien (LGV) Lymphogranuloma Venereum (LGV)

*Le lymphogranulome vénérien (LGV) est une infection transmissible sexuellement (ITS) causée par une souche de bactérie chlamydia. Les infections se produisent généralement dans le système lymphatique de la zone génitale. Le parasite peut également se trouver dans les fluides corporels tels que le sperme, la pré-éjaculation, et les fluides provenant du vagin et de l'anus.*

*Le LGV peut être guéri avec des antibiotiques. Il a toujours été rare en Colombie-Britannique, mais il est maintenant de plus en plus courant, surtout chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes.*

### Causes Causes

Le LGV peut être transmis par contact sexuel vaginal, oral et anal. Cela inclut à la fois les rapports sexuels avec pénétration et les activités sexuelles où il y a un échange de fluides corporels. Vous pouvez également obtenir le LGV en partageant des jouets sexuels. Si vous avez le LGV, vous pouvez le transmettre à d'autres personnes, même si vous ne présentez pas de symptômes.

### Symptômes Symptoms

Il est commun de ne pas remarquer de symptômes avec le LGV. Si vous présentez des symptômes, ils apparaîtront probablement dans les 3 jours à 6 semaines après un contact sexuel. Le LGV peut provoquer de la fièvre, de la fatigue, des plaies indolores et un gonflement des ganglions lymphatiques dans la région génitale. Il peut également conduire à des abcès génitaux. Occasionnellement, le LGV peut provoquer des symptômes dans les articulations, les poumons et le foie. Si vous avez des rapports sexuels anaux, il peut y avoir un écoulement de mucus et des saignements de l'anus.

### Tests et diagnostics Tests and Diagnosis

Le diagnostic du LGV peut être compliqué et repose sur les symptômes, l'examen de toute plaie ou gonflement et les antécédents sexuels. Le test est habituellement effectué avec un échantillon de sang ou un écouvillon de la plaie.

Il est préférable de faire un test de dépistage du LGV si vous avez des symptômes ou si vous avez un partenaire chez qui on a diagnostiqué un LGV.

### Traitement Treatment

Le LGV est traité avec des antibiotiques sur ordonnance. Il est important de prendre tous vos médicaments selon les directives. Si vous oubliez une dose, l'infection peut ne pas être guérie. Consultez votre fournisseur de soins de santé si cela se produit ou si vous avez encore des symptômes quand le traitement se termine.

Il est également important de ne pas avoir de rapports sexuels (même avec un préservatif) pendant les 3 semaines qui suivent le début du traitement. Si vous avez des relations sexuelles pendant cette période, vous pourriez transmettre le LGV à votre partenaire sexuel ou l'obtenir de nouveau. Si cela se produit, parlez à votre fournisseur de soins de santé.

Les médicaments utilisés pour traiter le LGV sont disponibles gratuitement en Colombie-Britannique. Consultez votre fournisseur de soins de santé pour savoir s'il en a en stock.

## Partenaires sexuels Sexual Partners

Si vous recevez un diagnostic de LGV, vos partenaires sexuels au cours des deux derniers mois devraient également être testés et traités. Si vous n'avez pas eu de rapports sexuels au cours des deux derniers mois, votre dernier partenaire doit être testé et traité.

Il existe plusieurs façons de le dire à vos partenaires. Vous pouvez le dire aux partenaires vous-même ou de manière anonyme. Communiquez avec votre fournisseur de soins de santé pour déterminer qu'est-ce qu'il y a de mieux dans votre cas.

## Complications Complications

Si le LGV est traité à temps, il n'y a généralement pas d'autres problèmes de santé. En l'absence de traitement, il peut entraîner des problèmes de santé graves, dont :

- un plus grand risque d'obtention et de transmission du VIH;
- des sténoses (fermetures) et des fistules (ouvertures) génitales et rectales;
- une atteinte cardiaque, une méningite aseptique ou une maladie inflammatoire oculaire.

## Prévention Prevention

C'est une bonne idée d'être testé régulièrement pour les ITS, surtout si vous avez de nouveaux partenaires sexuels ou des relations ouvertes. En discutant avec ses partenaires de la sexualité à moindre risque, chacun sait à quoi s'attendre. Les préservatifs sont formidables s'ils fonctionnent pour vous – l'utilisation correcte des préservatifs réduit vos chances de contracter et de transmettre le LGV.

## Ressources Resources

SmartSexResource – En cas d'inquiétude ou d'anxiété au sujet du LGV  
<https://smartsexresource.com/topics/worry-and-anxiety>

TransCareBC – Information sur la santé sexuelle et génésique basée sur l'affirmation de genre  
<http://www.phsa.ca/transcarebc/care-support/access-care/sexual-hlth>