

Syphilis

Syphilis

*La syphilis est une infection transmissible sexuellement (ITS) causée par la bactérie *Treponema pallidum*. L'infection par la syphilis se déroule en plusieurs étapes : primaire, secondaire, latente précoce et latente tardive. Chaque stade présente des symptômes différents.*

La syphilis alterne entre des périodes où elle est active et inactive. Lorsque la syphilis est active, il peut y avoir des symptômes. Lorsque l'infection est inactive, aucun symptôme n'apparaît, même si vous avez toujours la syphilis.

La syphilis peut être guérie avec des antibiotiques.

Les taux de syphilis ont augmenté en Colombie-Britannique au cours des 20 dernières années. Actuellement, la syphilis est plus fréquente chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes.

Causes

Causes

Vous contractez la syphilis par contact sexuel vaginal, oral et anal. Cela inclut à la fois les rapports sexuels avec pénétration et les activités sexuelles où il y a un échange de fluides corporels ou un contact peau à peau. Vous pouvez également l'obtenir en partageant des jouets sexuels. Si vous avez la syphilis, vous pouvez la transmettre à d'autres personnes, même si vous ne présentez pas de symptômes. La syphilis peut se propager ou être contractée au cours des stades primaire, secondaire et latent précoce.

Symptômes

Symptoms

Si vous êtes atteint de la syphilis, il est courant de ne pas remarquer de symptômes. La syphilis est connue comme le grand imitateur, car elle ressemble à de nombreuses autres infections ou affections et est difficile à diagnostiquer.

Stade primaire : Une plaie indolore (chancre) peut se développer à l'endroit où la syphilis a pénétré dans le corps. La plaie n'est souvent pas perceptible et survient habituellement de 3 à 90 jours après le contact sexuel. La plaie apparaît le plus souvent dans la zone génitale, mais elle peut aussi se trouver sur les lèvres et la bouche. La plaie disparaît d'elle-même en quelques semaines, mais la syphilis continue de progresser.

Stade secondaire : Une éruption cutanée non prurigineuse peut se développer entre 14 et 90 jours après le contact sexuel. L'éruption peut apparaître n'importe où sur le corps, mais on la trouve le plus souvent sur la poitrine, le ventre, les organes génitaux, les paumes des mains et la plante des pieds. L'éruption disparaît généralement, mais elle peut revenir des mois plus tard. D'autres symptômes peuvent inclure des maux de tête, de la fièvre, une perte de cheveux, des ganglions lymphatiques gonflés et des bosses ou des plaques à l'intérieur de la bouche, de l'anus, du pénis ou des organes génitaux externes ou du vagin ou des organes génitaux internes.

Stade latent : Si la syphilis n'est pas traitée, elle évolue vers un stade latent. La période de latence peut durer jusqu'à 30 ans ou plus, et il se peut que vous n'avez pas de symptômes pendant cette période. La syphilis latente

comporte deux stades : la syphilis latente précoce (si la personne a contracté la syphilis au cours de la dernière année) et la syphilis latente tardive.

Tests et diagnostics Tests and Diagnosis

Le test est habituellement effectué avec un échantillon de sang ou un écouvillon de la plaie (chancre) si elle est présente.

Il est préférable de se faire tester pour la syphilis si vous :

- avez des symptômes;
- avez un partenaire sexuel qui a obtenu un résultat positif au test de dépistage de la syphilis;
- faites un dépistage systématique des ITS;
- êtes enceinte.

Fenêtre sérologique (temps d'attente avant le test) :

La plupart des tests par écouvillonnage sont précis lorsque vous présentez des symptômes. Les tests sanguins sont les plus précis 90 jours après le contact avec la syphilis. En Colombie-Britannique, la plupart des résultats des tests devraient être prêts dans 10 jours.

Traitement Treatment

La syphilis est traitée avec des antibiotiques sur ordonnance, habituellement par injection par un fournisseur de soins de santé. Il est important de prendre tous vos médicaments selon les directives. Si vous oubliez une dose, l'infection peut ne pas être guérie. Consultez votre fournisseur de soins de santé si cela se produit ou si vous avez encore des symptômes quand le traitement se termine.

Il est également important de ne pas avoir de rapports sexuels (même avec un préservatif) pendant les 14 jours qui suivent le début du traitement. Si vous avez des relations sexuelles pendant cette période, vous pourriez transmettre la syphilis à votre partenaire sexuel ou l'obtenir de nouveau. Si cela se produit, parlez à votre fournisseur de soins de santé.

Les médicaments utilisés pour traiter la syphilis sont disponibles gratuitement en Colombie-Britannique. Consultez votre fournisseur de soins de santé pour savoir s'il en a en stock. Si votre fournisseur de soins de santé n'a pas le médicament en stock, il peut se le faire envoyer par le BC Centre for Disease Control.

Après le traitement, des analyses sanguines de suivi sont effectuées à 6 et 12 mois, puis tous les 6 mois pendant 2 ans pour s'assurer que le traitement antibiotique a fonctionné. Les tests sont effectués plus souvent si vous êtes immunodéprimé.

Partenaires sexuels Sexual Partners

Vos partenaires sexuels au cours des 3 à 12 derniers mois devraient être testés et traités pour la syphilis. Cela dépendra du stade de la syphilis diagnostiquée.

Il existe plusieurs façons de le dire à vos partenaires. Vous pouvez le dire aux partenaires vous-même ou de manière anonyme. Communiquez avec votre fournisseur de soins de santé pour déterminer qu'est-ce qu'il y a de mieux dans votre cas.

Complications

Complications

Il n'y a habituellement pas d'autres problèmes de santé si vous traitez la syphilis tôt. En l'absence de traitement, elle peut entraîner des problèmes de santé graves, dont :

- un risque plus élevé de contracter et de transmettre le VIH;
- la stérilité.
- **Stade tardif** : La syphilis non traitée peut endommager le cerveau, le cœur et d'autres organes du corps. Les cas graves de la maladie peuvent causer la mort.
- **Neurosyphilis** : L'infection du système nerveux central peut survenir à n'importe quel stade. Les symptômes peuvent inclure des maux de tête, des vertiges, des changements de personnalité, des problèmes d'équilibre, une démence, des changements de vision, une perte d'audition, un engourdissement ou une faiblesse dans les jambes.

Grossesse : Si vous êtes enceinte, vous devriez passer un test de dépistage de la syphilis. Vous pouvez transmettre la syphilis à votre enfant pendant la grossesse et l'accouchement.

Prévention

Prevention

C'est une bonne idée d'être testé régulièrement pour les ITS, surtout si vous avez de nouveaux partenaires sexuels ou des relations ouvertes. En discutant avec ses partenaires de la sexualité à moindre risque, chacun sait à quoi s'attendre. Les préservatifs sont formidables s'ils fonctionnent pour vous – l'utilisation correcte des préservatifs réduit vos chances de contracter et de transmettre la syphilis.

Ressources

Resources

HealthLink BC - Informations sur la syphilis en plusieurs langues <https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/syphilis>

Histoire de la syphilis – Site d'information sur la syphilis du BC Centre for Disease Control
<http://syphistory.ca/>

CATIE – Information sur la syphilis (Canada)
<http://www.catie.ca/syphilis>

SmartSexResource – En cas d'inquiétude ou d'anxiété au sujet de la syphilis.
<https://smartsexresource.com/topics/worry-and-anxiety>

TransCareBC – Information sur la santé sexuelle et génésique basée sur l'affirmation de genre
<http://www.phsa.ca/transcarebc/care-support/access-care/sexual-hlth>