BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

STI/HIV Services 604.707.5600
Clinical Prevention Services 604.707.5604
655 West 12th Avenue bccdc.ca
Vancouver, BC V5Z 4R4 SmartSexResource.com

AMOXICILLINE (AMOXICILLIN)

L'amoxicilline est un antibiotique administré par voie orale pour traiter certaines infections transmissibles sexuellement (ITS).

Allergies (Allergies)

- Veuillez informer votre fournisseur de soins de santé si vous avez une allergie aux antibiotiques de la famille de la pénicilline (p. ex. l'amoxicilline, l'ampicilline, la cloxacilline, la pénicilline V-K, la pénicilline G benzathine, la pénicilline G sodique, la piperacilline) ou aux antibiotiques de la famille de la céphalosporine (p. ex. le céfadroxyl, la céphalexine, le céfaclor, le cefprozil).

Grossesse et allaitement (Pregnancy and Breast/Chest feeding)

- L'amoxicilline peut être utilisée sans danger au cours de la grossesse et de l'allaitement au sein ou au torse avec du lait exprimé. Veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé.

MISES EN GARDE (CAUTION)

- Laissez s'écouler un délai de 72 heures ou plus entre l'administration de la dernière dose d'amoxicilline et du vaccin oral vivant contre la typhoïde (Vivotif^{MD}).
- **Interactions médicamenteuses :** Veuillez noter que les interactions médicamenteuses spécifiques ne sont désormais plus mentionnées dans ce document. Si vous prenez des produits sur ordonnance, en vente libre, à base de plantes ou récréatifs, veuillez en discuter avec votre fournisseur de soins de santé.

Effets secondaires (Side effects)

- Vous pouvez avoir des éruptions cutanées, des diarrhées, des nausées ou des vomissements.
- Obtenez immédiatement une assistance médicale d'urgence si vous avez les signes suivants d'une réaction allergique : urticaire, difficultés à respirer, gonflement du visage, des lèvres, de la langue et de la gorge.

Instructions pour la prise (Instructions for Taking)

- Prenez le médicament avec ou sans nourriture jusqu'à la fin du traitement. Suivez la posologie recommandée par votre fournisseur de soins de santé.
- Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez, mais si vous êtes proche de la prochaine dose, sautez la dose manquée. Ne prenez pas une double dose.

Last review by BCCDC Pharmacy: May 2025

Instructions de conservation (Storage Instructions)

- Conservez ce médicament à la température ambiante entre 15 et 30 °C.
- Protégez-le de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.
- N'utilisez pas ces médicaments au-delà de la date de péremption imprimée.
- Ne le laissez pas à la portée des enfants.

Instructions spéciales (Special Instructions)

- N'ayez plus de relations sexuelles :
    - jusqu'à ce qu'une semaine se soit écoulée depuis le début de votre traitement ou suivant les conseils de votre fournisseur de soins de santé; et
    - avec vos partenaires sexuels actuels jusqu'à ce qu'une semaine se soit écoulée depuis le début de leur traitement, même si les résultats de leurs tests sont négatifs.

- Vous devrez suivre un nouveau traitement si vous avez des relations sexuelles avec un partenaire qui n'a pas été traité ou si vous avez des rapports avant même que toutes les parties concernées aient terminées leurs traitements. Veuillez en discuter avec votre fournisseur de soins de santé.
- **Contrôle de guérison :** Si votre fournisseur de soins de santé a prescrit de l'amoxicilline pour le traitement de la chlamydia ou de la gonorrhée, il est recommandé de **répéter le contrôle dans les 3 à 4 semaines qui suivent la fin du traitement pour s'assurer que l'infection a disparue.**

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations, consultez www.smartsexresource.com ou contactez votre fournisseur de soins de santé.