BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

STI/HIV Services 604.707.5600
Clinical Prevention Services 604.707.5604
655 West 12th Avenue bccdc.ca
Vancouver, BC V5Z 4R4 SmartSexResource.com

アモキシシリン (AMOXICILLIN)

アモキシシリンは、特定の性感染症 (STI) の治療のために経口で服用する抗生物質です。

アレルギー（Allergies）

- ペニシリン系抗生物質（アモキシシリン、アンピシリン、クロキサシリン、ペニシリン V-K 、ペニシリン G ベンザチン、 ペニシリン G ナトリウム、ピペラシリンなど）またはセフィキシム系抗生物質（ セファドロキシル、セファレキシン、セファクロル、 セフプロジルなど）にアレルギーがある場合は、ご自身の医療提供者にご相談ください。

妊娠と授乳（Pregnancy and Breast/Chest feeding）

- アモキシシリンは、妊娠中および授乳中でも使用することができます。 ご自身の医療提供者にご相談ください。

注意（CAUTION）

- アモキシシリンの最終服用と経口生腸チフスワクチン (Vivotif®) の服用の間は、 72 時間以上あけてください。
- 薬物相互作用： 個々の薬物の相互作用は、この文書には記載されなくなったことにご注意ください。処方薬、非処方薬、ハーブ系薬剤、またはレクリエーション薬物を服用している場合は、医療提供者にご相談ください。

副作用（Side effects）

- 発疹、頭痛、下痢、吐き気、または嘔吐が起こることがあります。
- じんましん、呼吸困難、顔・唇・舌・喉の腫れなどのアレルギー反応が出た場合は、直ちに緊急医療機関を受診してください。

Last review by BCCDC Pharmacy: May 2025

服用上の注意（Instructions for Taking）

- アモキシシリンは、完全に使い切るまで、食物と一緒または別に服用してください。ご自身の医療提供者の処方指示に従ってください。
- 飲み忘れた場合はできるだけ早く、または、次の服用時間が近い場合はそこからまた開始してください。２回分の用量を一度に服用しないでください。

保管上の注意（Storage Instructions）

- 15〜30°C の室温で保存してください。
- 光、熱、湿度を避けてください。
- 記載された有効期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

特別な指示（Special Instructions）

- 以下の時期まで性行為を避けてください。
  - 治療開始から一週間またはご自身の医療提供者の指示した期間が経過し、かつ
  - あなたのパートナー（たち）も治療を開始し、一週間が経過した時点まで。これはパートナー（たち）の検査結果が陰性であった場合も同様です。
- 未治療のパートナーと性行為を行った場合、または、あなたご自身またはパートナー（たち）が治療完了前に性行為を行った場合、あなたには再治療が必要になります 。ご自身の医療提供者にご相談ください。
- **治癒確認の検査**：クラミジアまたは淋病の治療目的でアモキシシリンが処方された場合には、**感染症が治癒したことを確認するために、治療完了後 3 〜 4 週間以内に再検査を受ける**ことをお勧めします。

ご質問または詳しい情報をご希望の場合は、www.smartsexresource.com にアクセスするか、またはご自身の医療提供者にご連絡ください。