BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

STI/HIV Services
Clinical Prevention Services
655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

604.707.5600
604.707.5604
bccdc.ca
SmartSexResource.com

아목시실린(AMOXICILLIN)

아목시실린은 특정 성 매개 감염(STI) 치료용으로 복용하는 항생제입니다.

알레르기(Allergies)

- 페니실린계 항생제(예: 아목시실린, 암피실린(ampicillin), 클록사실린(cloxacillin), 페니실린 V-K, 페니실린 G 벤자틴(penicillin G benzathine), 페니실린 G 소디엄(penicillin G sodium), 피페라실린(piperacillin)) 또는 세팔로스포린(cephalosporin)계 항생제(예: 세파드록실(cefadroxil), 세팔렉신(cephalexin), 세파클로르(cefaclor), 세프프로질(cefprozil))에 알레르기가 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오.

임신과 젖먹이기(Pregnancy and Breast/Chest feeding)

- 아목시실린은 임신과 수유 기간에 복용하셔도 됩니다. 의료 제공자와 상담하시기 바랍니다.

주의 사항(CAUTION)

- 아목시실린 마지막 용량 투여와 경구 장티푸스 생백신(Vivotif®) 투여 사이에 72 시간 이상 간격을 두십시오.
- 약물 상호 작용: 개개의 약물 상호 작용이 이 문서에 더는 기재되지 않음을 알려드립니다. 처방 약이나 비처방 약, 생약, 레크리에이션 제품을 복용 중이시면 의료 제공자와 상의하시기 바랍니다.

부작용(Side effects)

- 발진이나 두통, 설사, 메스꺼움, 구토가 있을 수 있습니다.
- 다음과 같은 알레르기 반응 징후가 있으면 즉시 응급 의료를 받으십시오: 두드러기, 호흡 곤란, 얼굴과 입술, 혀, 목구멍의 부기.

복용 방법(Instructions for Taking)

- 이 약은 마칠 때까지 음식과 함께 또는 빈속에 복용하십시오. 의료 제공자가 지시하는 용량을 따르십시오.

Last review by BCCDC Pharmacy: May 2025

- 복용을 1 회 잊으시면 기억나는 대로 바로 복용하십시오. 그러나 다음 용량을 복용할 시간이 거의 다 됐다면 놓친 용량을 건너뛰십시오. 두 배로 복용하지 마십시오.

보관 방법(Storage Instructions)

- 15°~30°C 의 상온에 보관하십시오.
- 빛, 열, 습기로부터 보호하십시오.
- 표시된 유효 기간이 지난 약은 사용하지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.

특별 주의 사항(Special Instructions)

- 다음 시점까지 성관계를 갖지 마십시오.
  - 치료 시작 후 1 주일 또는 의료 제공자가 권고한 기간 및
  - 검사 결과가 음성이어도 누구든지 지속적인 관계를 맺고 있는 파트너가 치료를 시작한 후 1 주일
- 치료를 받지 않은 파트너와 성관계를 하시는 경우 또는 본인이나 파트너의 치료가 완료되기 전에 성관계를 하시는 경우 재치료를 받으셔야 합니다. 의료 제공자와 상의하시기 바랍니다.
- **완치 여부 검사**: 의료 제공자가 클라미디아나 임질 치료용으로 아목시실린을 처방했다면 치료 완료 3~4 주 후에 **다시 검사하여 감염 완치 여부를 확인**하실 것을 권합니다.

궁금한 점이 있거나 정보가 더 필요하시면 http://www.smartsexresource.com 을 보시거나 의료 제공자에게 연락하시기 바랍니다.