BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

STI/HIV Services 604.707.5600
Clinical Prevention Services 604.707.5604
655 West 12th Avenue bccdc.ca
Vancouver, BC V5Z 4R4 SmartSexResource.com

AMOXICILLIN

Amoxicillin là một loại thuốc trụ sinh (kháng sinh) uống để điều trị một số bệnh nào đó truyền nhiễm qua đường tình dục (STIs).

Dị Ứng (Allergies)

- Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu quý vị bị dị ứng với bất cứ thuốc trụ sinh (kháng sinh) penicillin nào (chẳng hạn như amoxicillin, ampicillin, cloxacillin, penicillin V-K, penicillin G benzathine, penicillin G sodium, piperacillin) hoặc bất cứ thuốc trụ sinh cephalosporin nào (chẳng hạn như cefadroxil, cephalexin, cefaclor, cefprozil).

Thai Nghén và Cho Con Bú/Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ (Pregnancy and Breast/Chest feeding)

- Có thể dùng amoxicillin trong thời gian cho con bú/nuôi con bằng sữa mẹ. Xin hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

KHUYẾN CÁO (CAUTION)

- Hãy để qua 72 giờ hoặc lâu hơn nữa từ lần dùng liều amoxicillin cuối cùng và thuốc uống ngừa thương hàn (Vivotif®).
- Phản Ứng Giữa Các Loại Thuốc: Xin lưu ý là tài liệu này không còn liệt kê từng trường hợp phản ứng giữa các loại thuốc. Nếu quý vị đang dùng bất cứ thuốc theo toa, thuốc không cần toa, thảo dược, hoặc chất kích thích giải trí nào, xin hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

Tác Dụng Phụ (Side Effects)

- Quý vị có thể bị nổi đỏ trên da, tiêu chảy, buồn nôn, hoặc ói mửa.
- Hãy nhờ trợ giúp cấp cứu y tế ngay, nếu quý vị có các dấu hiệu phản ứng vì dị ứng sau đây: nổi mề đay, khó thở, hoặc sưng mặt, môi, lưỡi và cổ họng.

Last review by BCCDC Pharmacy: May 2025

Hướng Dẫn Dùng Thuốc (Instructions for Taking)

- Uống thuốc chung hoặc không chung với thức ăn cho đến khi hết thuốc. Hãy theo đúng hướng dẫn về liều lượng của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.
- Nếu quý vị quên một liều, hãy uống ngay khi nhớ ra, nhưng nếu gần đến giờ dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đó và tiếp tục dùng thuốc theo giờ thường lệ của quý vị. Đừng dùng liều gấp đôi.

Hướng Dẫn Lưu Trữ (Storage Instructions)

- Cất thuốc ở nhiệt độ trong phòng từ 15 đến 30°C.
- Bảo vệ tránh ánh sáng, nhiệt và hơi ẩm.
- Không dùng thuốc quá ngày hết hạn ghi trên nhãn.
- Cất xa tầm với của trẻ em.

Hướng Dẫn Đặc Biệt (Special Instructions)

- Đừng làm tình cho đến:
  - Một tuần sau khi quý vị đã bắt đầu điều trị, hoặc theo khuyến cáo của chuyên viên chăm sóc sức khỏe, VÀ
  - Một tuần sau khi (các) bạn tình đã bắt đầu điều trị, ngay cả khi kết quả thử nghiệm của họ là âm tính.
- Quý vị sẽ cần phải điều trị lại nếu quý vị làm tình với một bạn tình chưa được điều trị, hoặc nếu quý vị làm tình trước khi quý vị hoặc bạn tình của mình điều trị xong. Xin hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe.
- **Thử Nghiệm Lành Bệnh:** Nếu chuyên viên chăm sóc sức khỏe đã kê toa amoxicillin để điều trị chlamydia hoặc bệnh lậu, **quý vị nên thử nghiệm lại 3-4 tuần sau khi điều trị xong để chắc chắn là đã lành bệnh.**

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào hay cần thêm chi tiết, xin đến www.smartsexresource.com hoặc liên lạc với chuyên viên chăm sóc sức khỏe.