BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

STI/HIV Services 604.707.5600
Clinical Prevention Services 604.707.5604
655 West 12th Avenue bccdc.ca
Vancouver, BC V5Z 4R4 SmartSexResource.com

AZITHROMYCINE (AZITHROMYCIN)

L'azithromycine est un antibiotique administré par voie orale pour traiter certaines infections transmissibles sexuellement (ITS).

Allergies (Allergies)

- Veuillez informer votre fournisseur de soins de santé si vous avez une allergie aux antibiotiques de type macrolide comme l'azithromycine, l'érythromycine ou la clarithromycine.

Grossesse et allaitement (Pregnancy and Breast/Chest feeding)

- L'azithromycine doit être utilisée avec prudence au cours de la grossesse et de l'allaitement au sein ou au torse avec du lait exprimé. Veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé.

MISES EN GARDE (CAUTION)

- Ne prenez pas d'antiacides à base d'aluminium ou de magnésium en même temps que l'azithromycine. Attendez une à deux heures entre les prises.
- Veuillez informer votre fournisseur de soins de santé si vous avez une maladie du foie, une maladie du rein et/ou des antécédents de maladie cardiaque, d'arythmie ou de perturbation de l'équilibre électrolytique (p. ex. la bradycardie, l'allongement de l'intervalle QT, l'hypokaliémie et l'hypomagnésémie).
- Interactions médicamenteuses : Veuillez noter que les interactions médicamenteuses spécifiques ne sont désormais plus mentionnées dans ce document. Si vous prenez des produits sur ordonnance, en vente libre, à base de plantes ou récréatifs, veuillez en discuter avec votre fournisseur de soins de santé.

Effets secondaires (Side Effects)

- Vous pouvez avoir des diarrhées, des nausées, des douleurs abdominales ou des vomissements.

Instructions pour la prise (Instructions for Taking)

- L'azithromycine peut être prise avec ou sans nourriture.
- Suivez la posologie recommandée par votre fournisseur de soins de santé.

Last review by BCCDC Pharmacy: May 2025

Instructions de conservation (Storage Instructions)

- Conservez ce médicament à la température ambiante entre 15 et 30 °C.
- Protégez-le de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.
- N'utilisez pas ce médicament au-delà de la date de péremption imprimée.
- Ne le laissez pas à la portée des enfants.

Instructions spéciales (Special Instructions)

- N'ayez plus de relations sexuelles :
    - jusqu'à ce qu'une semaine se soit écoulée depuis le début de votre traitement ou suivant les conseils de votre fournisseur de soins de santé; et
    - avec vos partenaires sexuels actuels jusqu'à ce qu'une semaine se soit écoulée depuis le début de leur traitement, même si les résultats de leurs tests sont négatifs.
- Vous devrez suivre un nouveau traitement si vous avez des relations sexuelles avec un partenaire qui n'a pas été traité ou si vous avez des rapports avant même que toutes les parties concernées aient terminées leurs traitements. Veuillez en discuter avec votre fournisseur de soins de santé.

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations, consultez www.smartsexresource.com ou contactez votre fournisseur de soins de santé.