BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

STI/HIV Services 604.707.5600
Clinical Prevention Services 604.707.5604
655 West 12th Avenue bccdc.ca
Vancouver, BC V5Z 4R4 SmartSexResource.com

아지트로마이신(AZITHROMYCIN)

아지트로마이신은 특정 성 매개 감염(STI) 치료용으로 복용하는 항생제입니다.

알레르기(Allergies)

- 아지트로마이신, 에리트로마이신(erythromycin), 클래리트로마이신(clarithromycin) 같은 마크롤라이드(macrolide)계 항생제에 알레르기가 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오.

임신과 젖먹이기(Pregnancy and Breast/Chest feeding)

- 아지트로마이신은 임신과 수유 기간에 주의하여 사용하셔도 됩니다. 의료 제공자와 상담하시기 바랍니다.

주의 사항(CAUTION)

- 알루미늄 및/또는 마그네슘이 함유된 제산제를 아지트로마이신과 동시에 복용하지 마십시오. 두 시간 이상 간격을 두십시오.
- 간 질환이나 콩팥병 및/또는 기존 심장 질환이나 부정맥, 전해질 장애(예: 느린맥박, QT 간격 연장, 저칼륨 혈증, 저마그네슘 혈증)가 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오.
- 약물 상호 작용: 개개의 약물 상호 작용이 이 문서에 더는 기재되지 않음을 알려드립니다. 처방 약이나 비처방 약, 생약, 레크리에이션 제품을 복용 중이시면 의료 제공자와 상의하시기 바랍니다.

부작용(Side Effects)

- 설사나 메스꺼움, 복통, 구토가 있을 수 있습니다.

Last review by BCCDC Pharmacy: May 2025

복용 방법(Instructions for Taking)

- 아지트로마이신은 음식과 함께 또는 빈속에 복용하셔도 됩니다.
- 의료 제공자가 지시하는 용량을 따르십시오.

보관 방법(Storage Instructions)

- 15~30℃ 의 상온에 보관하십시오.
- 빛, 열, 습기로부터 보호하십시오.
- 표시된 유효 기간이 지난 약은 사용하지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.

특별 주의 사항(Special Instructions)

- 다음 시점까지 성관계를 갖지 마십시오.
    - 치료 완료 후 1 주일 또는 의료 제공자가 권고한 기간 및
    - 검사 결과가 음성이어도 누구든지 지속적인 관계를 맺고 있는 파트너가 치료를 시작한 후 1 주일
- 치료를 받지 않은 파트너와 성관계를 하시는 경우 또는 본인이나 파트너의 치료가 완료되기 전에 성관계를 하시는 경우 재치료를 받으셔야 합니다. 의료 제공자와 상의하시기 바랍니다.

궁금한 점이 있거나 정보가 더 필요하시면 http://www.smartsexresource.com 을 보시거나 의료 제공자에게 연락하시기 바랍니다