



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

604.707.2443
604.707.2441

www.bccdc.ca

Clinical Prevention Services –
STI Control

604.707.5600
604.707.5604

www.SmartSexResource.com

阿奇霉素 Azithromycin

阿奇霉素(Azithromycin)是用于治疗某些性传播感染疾病的口服抗生素。

过敏(Allergies)

- 若您对任何大环内酯类抗生素过敏，如阿奇霉素（Z-pak[®], Zithromax[®]）、红霉素或克拉霉素(Biaxin[®])，请告知医务人员。

怀孕/哺乳 (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- 怀孕和哺乳期间可谨慎使用阿奇霉素。请咨询医务人员。

警告 (CAUTION)

- 请勿在服用阿奇霉素的同时服用含有铝和/或镁的抗酸剂。两种药物应间隔至少两小时服用。
- 如果您有任何既往存在的心脏病、心律失常或电解质紊乱，如心动过缓、QT 间期延长、低钾血症和低镁血症，请通知医务人员。
- 服用阿奇霉素期间，请勿服用以下药物：
 - 抗精神病药：匹莫齐特 (Orap[®])、齐拉西酮 (Zeldox[®])
 - 抗病毒药：沙奎那韦 (Invirase[®])
 - 心脏：决奈达隆 (Multaq[®])
 - 偏头痛：双氢麦角胺 (Migranal[®])
- 药物相互作用：请注意，本文件不再列出个别药物的相互作用。如果您在服用任何处方药、非处方药、草药或消遣娱乐产品，请与医务人员讨论。

副作用 (Side effects)

- 您可能会出现腹泻、恶心、腹痛或呕吐。

服药说明 (Instructions for Taking)

- 饭前饭后均可服用阿奇霉素。
- 请遵循医务人员的剂量指示。

阿奇霉素（续） Azithromycin (cont'd)

贮存说明 (Storage Instructions)

- 贮存于15-30°C室温下。
- 避光、防高温、防潮。
- 药物超出印刷的失效日期，切勿使用。
- 谨防儿童接触。

特殊说明 (Special Instructions)

- 在未满足下列条件之前，不要进行性生活：
 - 您的治疗结束后已满一周；或遵照医务人员的建议，**并且**
 - 您的性伴侣也已接受治疗，**而且**自治疗开始后已经过了一周，即使他们的检测结果为阴性亦需治疗。
- 如果您与未经治疗的伴侣发生性关系，或是在您或伴侣的治疗完成之前发生性行为，则需重新治疗。请与医务人员讨论。

如果您有疑问或需要更多信息，
请访问www.smartsexresource.com或联系医务人员。