



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

604.707.2443
604.707.2441

www.bccdc.ca

Clinical Prevention Services –
STI Control

604.707.5600
604.707.5604

www.SmartSexResource.com

Azitromicina Azithromycin

La azitromicina es un antibiótico que se toma por vía oral para el tratamiento de ciertas infecciones de transmisión sexual (ITS).

Alergias (Allergies)

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alergia a algún **antibiótico macrólido**, como la azitromicina (Z-pak[®], Zithromax[®]), eritromicina o claritromicina (Biaxin[®]).

Embarazo y lactancia (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- La azitromicina puede usarse con precaución durante el embarazo y la lactancia. Consulte a su proveedor de atención médica.

ADVERTENCIA (CAUTION)

- **No tome antiácidos que contengan aluminio o magnesio** al mismo tiempo que toma azitromicina. Tómelos con al menos dos horas de diferencia.
- **Informe a su proveedor de atención médica si tiene afecciones cardíacas, alteraciones de los electrolitos o arritmia preexistentes** (p. ej., bradicardia, prolongación del intervalo QT, hipopotasemia, hipomagnesemia).
- **No tome los siguientes medicamentos mientras toma azitromicina:**
 - **Antipsicóticos:** pimozida (Orap[®]), ziprasidona (Zeldox[®])
 - **Antiviral:** saquinavir (Invirase[®])
 - **Cardíacos:** dronedarona (Multaq[®])
 - **Migraña:** dihidroergotamina (Migranal[®])
- **Interacciones medicamentosas:** tenga en cuenta que este documento ya no incluye las interacciones medicamentosas individuales. Hable con su proveedor de atención médica si toma algún producto recetado, de venta libre, a base de hierbas o recreativo.

Efectos secundarios (Side Effects)

- Es posible que presente diarrea, náusea, dolor abdominal o vómito.

Instrucciones para su uso (Instructions for Taking)

- La azitromicina puede tomarse con o sin alimentos.
- Siga las instrucciones de dosificación de su proveedor de atención médica.

Azitromicina (continuación) Azithromycin (cont'd)

Instrucciones de almacenaje (Storage Instructions)

- Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la luz, el calor y la humedad.
- No consumir los medicamentos después de la fecha de caducidad impresa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Instrucciones especiales (Special Instructions)

- No tenga relaciones sexuales:
 - hasta 1 semana después de completar su tratamiento, o según las recomendaciones de su proveedor de atención médica, **y**
 - hasta que su(s) pareja(s) sexual(es) también haya(n) recibido tratamiento **y** haya pasado una semana desde el inicio de su tratamiento, aunque los resultados de su prueba sean negativos.
- Tendrá que volver a recibir tratamiento si tiene relaciones sexuales con una pareja que no haya recibido tratamiento, o si tiene relaciones sexuales antes de que su tratamiento o el de su pareja hayan terminado. Consulte a su proveedor de atención médica.

Si tiene alguna pregunta o si necesita información adicional, visite www.smartsexresource.com o comuníquese con su proveedor de atención médica.