BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

STI/HIV Services 604.707.5600
Clinical Prevention Services 604.707.5604
655 West 12th Avenue bccdc.ca
Vancouver, BC V5Z 4R4 SmartSexResource.com

AZITHROMYCIN

Azithromycin là một loại thuốc trụ sinh (kháng sinh) uống để điều trị một số bệnh nào đó truyền nhiễm qua đường tình dục (STIs).

Dị Ứng (Allergies)

- Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu quý vị bị dị ứng với bất cứ thuốc trụ sinh (kháng sinh) macrolide nào như azithromycin, erythromycin, hoặc clarithromycin.

Thai Nghén và Cho Con Bú/Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ (Pregnancy and Breast/Chest feeding)

- Có thể sử dụng cẩn thận azithromycin trong thời gian mang thai và trong khi cho con bú/nuôi con bằng sữa mẹ. Xin tham khảo với chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

KHUYẾN CÁO (CAUTION)

- Không dùng các loại thuốc antacid (kháng acid) có chứa nhôm và/hoặc magnesium cùng lúc với azithromycin. Dùng cách nhau ít nhất hai giờ.
- Xin thông báo cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe nếu quý vị đang bị bệnh gan, bệnh thận, và/hoặc bất cứ bệnh tim nào từ trước, loạn nhịp tim hoặc rối loạn chất điện giải (chẳng hạn như nhịp tim chậm, QT kéo dài, hạ kali máu, hạ magnesium máu)
- Phản Ứng Giữa Các Loại Thuốc: Xin lưu ý là tài liệu này không còn liệt kê từng trường hợp phản ứng giữa các loại thuốc. Nếu quý vị đang dùng bất cứ thuốc theo toa, thuốc không cần toa, thảo dược, hoặc các sản phẩm giải trí nào, xin thảo luận với chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

Tác Dụng Phụ (Side Effects)

- Quý vị có thể bị tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng, ói mửa, nhức đầu, và chóng mặt.

Hướng Dẫn Dùng Thuốc (Instructions for Taking)

- Có thể dùng azithromycin chung hoặc không chung với thức ăn.
- Hãy theo đúng hướng dẫn về liều lượng của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

Last review by BCCDC Pharmacy: May 2025

Hướng Dẫn Lưu Trữ (Storage Instructions)

- Cất thuốc ở nhiệt độ trong phòng từ 15 đến 30°C.
- Bảo vệ tránh ánh sáng, nhiệt và hơi ẩm.
- Đừng dùng thuốc quá ngày hết hạn đã in.
- Cất xa tầm với của trẻ em.

Hướng Dẫn Đặc Biệt (Special Instructions)

- Đừng làm tình cho đến:
    - Một tuần sau khi quý vị bắt đầu điều trị, hoặc theo lời dặn của chuyên viên chăm sóc sức khỏe, VÀ
    - Một tuần sau khi bất cứ bạn tình nào đã bắt đầu điều trị, ngay cả khi kết quả thử nghiệm của họ là âm tính.
- Quý vị sẽ cần phải điều trị lại nếu quý vị làm tình với một bạn tình chưa được điều trị, hoặc nếu quý vị làm tình trước khi quý vị hoặc bạn tình của mình điều trị xong. Xin hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào hay cần thêm chi tiết, xin đến www.smartsexresource.com hoặc liên lạc với chuyên viên chăm sóc sức khỏe.