



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.2443
Fax 604.707.2441

www.bccdc.ca

Clinical Prevention Services –
STI Control:

604.707.5600
604.707.5604

www.SmartSexResource.com

头孢曲松 Ceftriaxone

头孢曲松是用于某些性传播感染疾病的肌肉注射抗生素。

过敏(Allergies)

- 如果您对头孢曲松、其他头孢菌素类抗生素如头孢克肟 (Suprax®)、头孢氨苄 (Keflex®)、头孢克洛 (Ceclor®) 或青霉素类抗生素如青霉素 V-K、阿莫西林 (Amoxil®) 或
- 对利多卡因或其他局部麻醉剂或酰胺类局麻药 (如丙胺卡因、美西律、胺碘酮) 过敏, 请告知医务人员。利多卡因与头孢曲松混合, 用于减轻注射部位疼痛)。

怀孕/哺乳 (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

怀孕和哺乳期间可谨慎使用头孢曲松。请咨询医务人员。

警告 (CAUTION)

- 如果您有任何胆囊、肝脏、肾脏、胰腺或出血性疾病, 或者有胃功能障碍史, 特别是结肠炎, 请告知医务人员。
- 头孢曲松不能与以下药物同服:
 - 口服伤寒疫苗 (Vivotif®)
- 头孢曲松可干扰某些尿糖测试。(Clinitest®)
- 头孢曲松不得用于治疗早产儿或出生不到一个月婴儿的高胆红素血症。
- **药物相互作用:** 请注意, 本文件不再列出个别药物的相互作用。如果您在服用任何处方药、非处方药、草药或消遣娱乐产品, 请与医务人员讨论。

副作用 (Side effects)

- 您可能会感到注射部位不适、发红或肿胀。
- 您可能会出现腹泻。
- 如果上述任何副作用持续或恶化, 请联系医务人员。

头孢曲松 (续) Ceftriaxone (cont'd)

治疗后的护理 (Care Following Treatment)

- 注射后请在诊所等候 15 分钟。
- 如果您在治疗后有任何反应（如皮疹、瘙痒、呼吸困难），请立即通知工作人员。
- 如果离开诊所后出现这些症状，请立即看急诊。

特殊说明 (Special Instructions)

- 在未满足下列条件之前，不要进行性生活：
 - 您完成头孢曲松治疗后已满一周，或
 - 您的性伴侣也已完成治疗，即使他们的检测结果为阴性亦需治疗。
- 如果您与未经治疗的伴侣发生性关系，或是在您或伴侣的治疗完成之前发生性行为，则需重新治疗。请与医务人员讨论。

如果您有疑问或需要更多信息，
请访问 www.smartsexresource.com 或联系医务人员。