



**BC Centre for Disease Control**  
An agency of the Provincial Health Services Authority

655 West 12th Avenue  
Vancouver, BC V5Z 4R4

604.707.2443  
604.707.2441

www.bccdc.ca

Clinical Prevention Services –  
STI Control

604.707.5600  
604.707.5604

www.SmartSexResource.com

## 독시사이클린 Doxycycline

독시사이클린은 특정 성 매개 감염(STI) 치료용으로 복용하는 항생제입니다.

### 알레르기(Allergies)

- 테트라사이클린(tetracycline)계 항생제(예: 테트라사이클린, 미노사이클린(minocycline))에 알레르기가 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오.

### 임신과 수유(Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- 독시사이클린은 임신 중 복용이 안전하지 않습니다.
- 독시사이클린은 젖먹이에게 알려지지 않은 노출 영향 때문에 수유 기간에 복용하시면 안 됩니다. 의료 제공자와 상담하십시오.

### 주의 사항(CAUTION)

- **약물 상호 작용:** 처방 약이나 비처방 약, 생약, 기분 전환용 제품을 복용 중이시면 의료 제공자에게 알려주십시오. 개개의 모든 약물 상호 작용이 이 문서에 기재되어 있는 것은 아닙니다.
- 독시사이클린을 복용하면 피부가 더 민감해질 수 있고 햇볕에 많이 타기도 합니다. 햇빛이나 인공 자외선(태양등 또는 태닝 베드)에 노출되지 않게 하십시오. 햇빛을 쬐게 된다면 자외선 차단제를 사용하고 피부를 보호하는 옷을 입으십시오.
- 독시사이클린을 철분 보충제나 칼슘 보충제, 알루미늄과 마그네슘 함유 제산제, 비스무트 차살리실산염(bismuth subsalicylate)(Pepto Bismol®)과 동시에 복용하지 마십시오. 독시사이클린은 이런 제품을 복용하기 2시간 전이나 6시간 후에 복용하십시오.
- 독시사이클린은 중증 근육 무력증(myasthenia gravis)의 증상을 악화시킬 가능성이 있습니다. 중증 근육 무력증(신경 근육 장애)이 있으시면 독시사이클린을 복용하기 전에 의료 제공자와 상담하시기 바랍니다.
- 효모 감염 병력이 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오.
- 다음 약을 독시사이클린과 함께 복용하지 마십시오.
  - 아시트레틴(acitretin)(Soriatane®), 이소트레티노인(isotretinoin)(Accutane Roche®, Clarus®, Epuris®) 및 알리트레티노인(alitretinoin)(Toctino®, Hanzema™)

### 부작용(Side Effects)

- 설사, 메스꺼움, 갑작스럽고 심한 복통, 구토, 두통, 피부 발진, 광과민성(햇빛에 대한 민감성 증가) 등이 있을 수 있습니다.

## 독시사이클린 Doxycycline

### 복용 방법

#### (Instructions for Taking)

- 약을 음식과 함께 복용하여 배앓이를 피하십시오.
- 캡슐을 바수거나, 씹거나, 열지 마십시오.
- 물 한잔을 전부 마시면서 약을 통째로 삼킨 다음 30분 이상 똑바로 서 있거나 앉아 있으십시오.
- 복용을 1회 잊으시면 기억나는 대로 바로 복용하십시오. 그러나 다음 복용 시간이 가까우면 놓친 용량을 건너뛰고 평소 복용 시간을 다시 따르십시오. 두 배로 복용하지 마십시오.

### 보관 방법(Storage Instructions)

- 15°~30°C의 상온에 보관하십시오.
- 빛, 열, 습기로부터 보호하십시오.
- 표시된 유효기간이 지난 약은 사용하지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.

### 특별 주의 사항(Special Instructions)

- 다음 시점까지 성관계를 갖지 마십시오.
  - 치료 완료 시점 또는 의료 제공자가 권고한 기간 **및**
  - 검사 결과가 음성이어도 성관계 파트너 역시 치료를 받았고 **또한** 성관계 파트너의 치료가 시작된 이후 1주일이 경과함
- 치료를 받지 않은 파트너와 성관계를 하시는 경우 또는 본인이나 파트너의 치료가 완료되기 전에 성관계를 하시는 경우 재치료를 받으셔야 합니다. 의료 제공자와 상의하시기 바랍니다.

궁금한 점이 있거나 정보가 더 필요하시면 [www.smartsexresource.com](http://www.smartsexresource.com)을 보시거나  
의료 제공자에게 연락하시기 바랍니다.