



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

604.707.2443
604.707.2441

www.bccdc.ca

Clinical Prevention Services –
STI Control

604.707.5600
604.707.5604

www.SmartSexResource.com

Doxiciclina Doxycycline

La doxiciclina es un antibiótico que se toma por vía oral para el tratamiento de ciertas infecciones de transmisión sexual (ITS).

Alergias (Allergies)

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna alergia a algún **antibiótico a base de tetraciclina**, como la tetraciclina o la minociclina.

Embarazo y lactancia (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- **No** es seguro tomar doxiciclina durante el embarazo.
- Se debe evitar la doxiciclina durante la lactancia debido a los efectos desconocidos que la exposición pudiera tener en los bebés. Consulte a su proveedor de atención médica.

ADVERTENCIA (CAUTION)

- **Interacciones medicamentosas:** informe a su proveedor de atención médica si toma algún producto recetado, de venta libre, a base de hierbas o recreativo. Este documento no contiene todas las interacciones medicamentosas individuales.
- La doxiciclina puede hacer que su piel se haga más sensible y podría sufrir una quemadura solar. Evite la exposición a la luz solar o a los rayos UV artificiales (lámparas de sol o camas de bronceado). **Use filtro solar** y ropa protectora si va a exponerse al sol.
- **No tome complementos de hierro o de calcio, antiácidos que contengan aluminio o magnesio, o subsalicilatos de bismuto** (Pepto Bismol®) al mismo tiempo que toma doxiciclina. Tome la doxiciclina 2 horas antes o 6 horas después de tomar estos productos.
- **La doxiciclina tiene el potencial de empeorar los síntomas de la miastenia grave.** Si padece de miastenia grave (un trastorno neuromuscular), consulte a su proveedor de atención médica antes de tomar doxiciclina.
- Informe a su proveedor de atención médica si tiene antecedentes de candidiasis (infección por hongos).
- **No tome los siguientes medicamentos con doxiciclina:**
 - **acitretina** (Soriatane®), **isotretinoína** (Accutane Roche®, Clarus®, Epuris®) y **alitretinoína** (Toctino®, Hanzema™).

Efectos secundarios (Side Effects)

- Es posible que presente diarrea, náusea, dolor abdominal repentino e intenso, vómito, dolor de cabeza, salpullido y fotosensibilidad (mayor sensibilidad al sol).

Doxiciclina (continuación) Doxycycline (cont'd)

Instrucciones para su uso (Instructions for Taking)

- Tome el medicamento con alimentos para evitar el malestar estomacal.
- No triture, mastique ni abra las cápsulas.
- Tráguese el medicamento entero con un vaso de agua lleno, y permanezca parado o sentado en posición vertical durante al menos 30 minutos después de tomarlo.
- Si se le olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Pero si ya casi es hora de tomar la siguiente dosis, omita la dosis que olvidó y retome su hora habitual de dosificación. No tome una dosis doble.

Instrucciones de almacenaje (Storage Instructions)

- Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la luz, el calor y la humedad.
- No consumir los medicamentos después de la fecha de caducidad impresa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Instrucciones especiales (Special Instructions)

- No tenga relaciones sexuales:
 - Hasta que haya terminado su tratamiento o según lo que le aconseje su proveedor de atención médica, **y**
 - Hasta que su(s) pareja(s) sexual(es) también haya(n) recibido tratamiento **y** haya pasado una semana desde el inicio de su tratamiento, aunque los resultados de su prueba sean negativos.
- Tendrá que volver a recibir tratamiento si tiene relaciones sexuales con una pareja que no haya recibido tratamiento, o si tiene relaciones sexuales antes de que el tratamiento suyo o de su pareja haya terminado. Consulte a su proveedor de atención médica.

Si tiene alguna pregunta o si necesita información adicional,
visite www.smartsexresource.com o comuníquese con su proveedor de atención médica.