



BC Centre for Disease Control  
An agency of the Provincial Health Services Authority

655 West 12th Avenue  
Vancouver, BC V5Z 4R4

604.707.2443  
604.707.2441

www.bccdc.ca

Clinical Prevention Services –  
STI Control

604.707.5600  
604.707.5604

www.SmartSexResource.com

## Doxycycline Doxycycline

Doxycycline là một loại thuốc trụ sinh (kháng sinh) uống để điều trị một số bệnh nào đó truyền nhiễm qua đường tình dục (STIs).

### Dị Ứng (Allergies)

- Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu quý vị bị dị ứng với bất cứ loại **thuốc trụ sinh tetracycline** nào như tetracycline hoặc minocycline.

### Thai Nghén và Cho Con Bú/Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- Doxycycline **không** an toàn để dùng trong thời kỳ thai nghén.
- Nên tránh dùng Doxycycline trong thời gian cho con bú/nuôi con bằng sữa mẹ vì trẻ sơ sinh có thể bị các ảnh hưởng không rõ. Hãy tham khảo với chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

### KHUYẾN CÁO (CAUTION)

- Phản Ứng Giữa Các Loại Thuốc:** Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu quý vị đang dùng bất cứ thuốc theo toa, thuốc không cần toa, thảo dược, hoặc các sản phẩm giải trí nào. Không phải tất cả mỗi phản ứng giữa các loại thuốc đều được liệt kê trong tài liệu này.
- Doxycycline có thể làm cho da của quý vị nhạy cảm hơn và quý vị có thể bị cháy nắng. Tránh tiếp xúc với ánh nắng hoặc tia UV nhân tạo (đèn đốt rám da hoặc giường phơi rám da). **Hãy dùng kem chống nắng** và mặc quần áo bảo vệ nếu quý vị sẽ ra nắng.
- Đừng dùng thuốc bổ sung chất sắt, thuốc bổ sung chất vôi, các loại thuốc antacids (kháng acid) có chứa chất nhôm và magnesium hoặc bismuth subsalicylates (Pepto Bismol®)** cùng lúc với doxycycline. Hãy dùng doxycycline 2 giờ trước hoặc 6 giờ sau khi uống các sản phẩm này.
- Doxycycline có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của chứng nhược cơ.** Nếu quý vị bị nhược cơ (chứng rối loạn thần kinh cơ), xin tham khảo với chuyên viên chăm sóc sức khỏe trước khi dùng doxycycline.
- Đừng dùng các loại thuốc sau đây với doxycycline:**
  - Acitretin (Soriatane®), isotretinoin (Accutane Roche®, Clarus®, Epuris®), và alitretinoin (Toctino®)**

### Tác Dụng Phụ (Side Effects)

- Quý vị có thể bị tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng bất ngờ và nặng, ói mửa, nhức đầu, nổi đỏ da, nhạy sáng (tăng mức nhạy cảm với ánh nắng).

### Hướng Dẫn Dùng Thuốc (Instructions for Taking)

- Dùng thuốc chung với thức ăn để tránh khó chịu dạ dày.
- Không nghiền nát, nhai, hoặc mở viên thuốc con nhộng.
- Nuốt trọn viên thuốc với một ly nước đầy, và đứng/ngồi thẳng lưng trong ít nhất 30 phút sau đó.
- Nếu quý vị quên một liều, hãy uống ngay khi nhớ ra. Tuy nhiên, nếu gần với giờ dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đó và tiếp tục dùng thuốc theo giờ thường lệ của quý vị. Đừng dùng liều gấp đôi.

### Hướng Dẫn Lưu Trữ (Storage Instructions)

- Lưu trữ ở nhiệt độ trong phòng từ 15 đến 30°C.
- Bảo vệ tránh ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm.
- Không dùng thuốc quá ngày hết hạn đã in.
- Cát xa tầm với của trẻ em.

### Hướng Dẫn Đặc Biệt (Special Instructions)

- Đừng làm tình cho đến khi:
  - Quý vị đã hoàn tất việc điều trị của mình hoặc theo khuyến cáo của chuyên viên chăm sóc sức khỏe, **và**
  - (Các) bạn tình của quý vị cũng đã được điều trị, **và** đã qua một tuần kể từ khi họ bắt đầu điều trị, ngay cả khi kết quả thử nghiệm của họ là âm tính.
- Quý vị sẽ cần phải điều trị lại nếu quý vị làm tình với một bạn tình chưa được điều trị, hoặc nếu quý vị làm tình trước khi quý vị hoặc bạn tình của mình điều trị xong. Xin thảo luận với chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào hay cần thêm tin tức, xin đến

[www.smartsexresource.com](http://www.smartsexresource.com) hoặc liên lạc với chuyên viên chăm sóc sức khỏe.