BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

STI/HIV Services 604.707.5600
Clinical Prevention Services 604.707.5604
655 West 12th Avenue bccdc.ca
Vancouver, BC V5Z 4R4 SmartSexResource.com

磷霉素 (FOSFOMYCIN)

磷霉素是一种口服抗生素，用于治疗无并发症尿路感染（UTI），包括膀胱感染。

过敏 (Allergies)

- 如果您对氨丁三醇或其任何配方成分（包括调味剂和亚硫酸盐）过敏或敏感，请告知医务人员。

怀孕/哺乳 (Pregnancy and Breast/Chest Feeding)

- 如果您计划怀孕，请告知医务人员。
- 在怀孕/哺乳期间可谨慎使用磷霉素。请咨询医务人员。

警告 (CAUTION)

- 如果您患有肝脏和/或肾脏疾病，请通知医务人员。
- **药物相互作用：**请注意，本文件不再列出个别药物的相互作用。如果您在服用任何处方药、非处方药、草药或消遣性药物产品，请与医务人员讨论。

副作用 (Side Effects)

- 您可能会出现：
  - 腹泻、腹痛、消化不良、恶心和呕吐
  - 皮疹和瘙痒
  - 头痛和头晕
  - 流鼻涕
  - 背部疼痛
- 服药后2个月或更长时间之后可能会出现腹泻。如果腹泻持续或恶化，请向医务人员报告。

服药说明 (Instructions for Taking)

- 遵循医务人员的用药剂量指示。
- 空腹或进食后至少2至3小时服用磷霉素。
- 将一小袋中所有磷霉素粉末倒入125毫升（1/2杯）冷水中进行溶解。充分搅拌溶解后立即服用。
- 不要直接服用干粉，也不要与热水混合。

Last review by BCCDC Pharmacy: May 2025

贮存说明 (Storage Instructions)

- 贮存于15-30°C室温下。避光、避热、防潮。
- 在服用前不要打开小袋。
- 药物超出印明的失效日期，切勿使用。
- 谨防儿童接触。

特殊说明 (Special Instructions)

- 如果您的症状在3天内未见改善或有所加重，请联系医务人员。

如果您有疑问或需要更多信息，请访问http://www.smartsexresource.com 或联系医务人员。