BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

STI/HIV Services 604.707.5600
Clinical Prevention Services 604.707.5604
655 West 12th Avenue bccdc.ca
Vancouver, BC V5Z 4R4 SmartSexResource.com

FOSFOMICINA (FOSFOMYCIN)

La fosfomicina es un antibiótico que se toma por vía oral para el tratamiento de infecciones simples de las vías urinarias, incluidas las infecciones de la vejiga.

Alergias (Allergies)

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alergia o sensibilidad a la fosfomicina trometamol o a cualquiera de los ingredientes de su fórmula, incluidos los saborizantes y los sulfitos.

Embarazo y lactancia (Pregnancy and Breast/Chest Feeding)

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene planes de quedar embarazada.
- La fosfomicina puede usarse con cautela durante el embarazo y la lactancia. Consulte a su proveedor de atención médica.

ADVERTENCIA (CAUTION)

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna enfermedad hepática o renal.
- **Interacciones medicamentosas:** tenga en cuenta que este documento ya no incluye las interacciones medicamentosas individuales. Hable con su proveedor de atención médica si toma algún producto recetado, de venta libre, a base de hierbas o recreativo, o si ha recibido recientemente una vacuna de organismo vivo.

Efectos secundarios (Side Effects)

- Podría presentar:
  - diarrea, dolor abdominal, indigestión, náusea y vómito
  - sarpullido y comezón
  - dolor de cabeza y mareo
  - escurrimiento nasal
  - dolor de espalda
- La diarrea se puede presentar 2 meses o más después de tomar su dosis. Informe a su proveedor de atención médica si su diarrea continúa o empeora.

Last review by BCCDC Pharmacy: May 2025

Instrucciones para su uso (Instructions for Taking)

- Siga las instrucciones de dosificación de su proveedor de atención médica.
- Tome la fosfomicina con el estómago vacío, o, por lo menos, 2 a 3 horas después de comer.
- Prepare la fosfomicina vaciando todo el polvo contenido en el paquete en 125 ml (1/2 taza) de agua fría. Mézclelo bien hasta que se disuelva y tómeselo de inmediato.
- No se tome el polvo seco directamente ni lo disuelva en agua caliente.

Instrucciones de almacenaje (Storage Instructions)

- Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C. Proteger de la luz, el calor y la humedad.
- No abrir el paquete hasta que vaya a consumirse la dosis.
- No consumir los medicamentos después de la fecha de caducidad impresa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Instrucciones especiales (Special Instructions)

- Si sus síntomas no han mejorado en 3 días o si están empeorando, comuníquese con su proveedor de atención médica.

Si tiene alguna pregunta o si necesita información adicional, visite http://www.smartsexresource.com o comuníquese con su proveedor de atención médica.