

Pénicilline G benzathine (Bicillin^{MD} L-A) pour le traitement de la syphilis

Penicillin G Benzathine (Bicillin[®] L-A) For Treatment of Syphilis

La pénicilline G benzathine (Bicillin^{MD} L-A) à action prolongée est l'antibiotique idéal pour le traitement de la syphilis. Chaque dose nécessite deux injections intramusculaires, une injection dans chaque muscle de la hanche (lieu préféré) ou du fessier lors de la même visite.

Une dose de 2,4 millions d'unités de Bicillin^{MD} L-A est habituellement suffisante pour traiter la syphilis infectieuse. Toutefois, si l'infection est présente depuis plus d'un an, ou si sa durée est inconnue, il faudra administrer trois injections de 2,4 millions d'unités de Bicillin^{MD} L-A; ces injections sont administrées une fois par semaine pendant trois semaines.

Allergies (Allergies)

- Si vous êtes allergique aux pénicillines ou aux céphalosporines, informez votre fournisseur de soins de santé :
 - par exemple, la pénicilline V-K et l'amoxicilline (Amoxil^{MD})
 - par exemple, la céfixime (Suprax^{MD}), la céphalexine (Keflex^{MD}) et le céfclor (Ceclor^{MD})

Grossesse et allaitement (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- Veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé si vous allaitez.
- Il est très important que vous suiviez un traitement suite à un diagnostic de syphilis lors d'une grossesse ou pendant la période d'allaitement.
- Si l'on vous traite contre la syphilis au cours de la deuxième moitié de votre grossesse, consultez votre fournisseur de soins de santé pour la prise en considération d'instructions particulières.

Mise en garde (Caution)

- **Interactions médicamenteuses** : Veuillez noter que les interactions médicamenteuses spécifiques ne sont désormais plus mentionnées dans ce document. Si vous prenez des produits sur ordonnance, en vente libre, à base de plantes ou récréatifs, veuillez en discuter avec votre fournisseur de soins de santé.

Soins après le traitement (Care of Yourself After Treatment)

- On vous demandera d'attendre pendant 15 minutes dans la clinique après les injections de Bicillin^{MD} L-A.
- Si vous éprouvez une quelconque réaction après le traitement (p. ex. éruptions cutanées, démangeaisons, difficultés respiratoires), informez un membre du personnel immédiatement.
- Si ces symptômes surviennent après avoir quitté la clinique, ayez recours aux soins d'urgence immédiatement (appelez le 9-1-1 ou allez à l'hôpital ou à un centre des soins d'urgence).

Effets secondaires (Side Effects)

- Vous pourriez avoir une légère douleur passagère au niveau du site d'injection.
- Vous pourriez avoir de la diarrhée après le traitement.
- Certains peuvent avoir une **réaction de Jarisch-Herxheimer** : fièvre, frissons, douleurs musculaires, maux de tête ou fatigue.
 - La réaction de Jarisch-Herxheimer se manifeste par la présence d'effets secondaires temporaires, pouvant se produire dans les quelques heures qui suivent un traitement de la syphilis. Ce n'est pas tout le monde qui aura cette réaction.
 - Ne vous inquiétez pas, **il ne s'agit pas d'une réaction allergique** et elle disparaît généralement dans les 24 heures.
 - Prenez de l'acétaminophène (Tylenol^{MD}) ou de l'ibuprofène (Advil^{MD}), au besoin, pour aider à soulager les symptômes.
- Si l'un de ces effets persiste ou s'aggrave, veuillez contacter votre fournisseur de soins de santé.

Étapes de la syphilis (Stages of Syphilis)

- Le traitement et les recommandations de suivi sont basés sur la durée de la présence de l'infection causée par la syphilis dans votre corps. Votre fournisseur de soins de santé vous informera au sujet de l'étape de votre syphilis et vous prescrira le traitement adapté. Vous pouvez également recevoir un appel du personnel infirmier au nom de la santé publique pour discuter du suivi du partenaire et des recommandations pour les tests de suivi (voir le tableau de la page suivante).

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations, consultez www.smartsexresource.com ou contactez votre fournisseur de soins de santé.

SYPHILIS : CE QU'IL FAUT SAVOIR (SYPHILIS: WHAT TO KNOW)

SYPHILIS INFECTIEUSE (Primaire, secondaire, latente précoce)	SYPHILIS LATENTE DE DURÉE INCONNUE (SLDI)* et SYPHILIS LATENTE TARDIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Peut avoir des symptômes tels qu'une plaie ou une éruption cutanée sur les organes génitaux ou la bouche. • Peut ne pas avoir de symptômes, mais peut tout de même se propager. • Durée de l'infection : moins d'un an. 	<ul style="list-style-type: none"> • Infection « cachée »; aucun symptôme et ne se propage* probablement pas, mais peut causer des dommages à votre corps si elle n'est pas traitée. • Durée de l'infection : plus d'un an ou durée inconnue. <p><i>* Comme la durée de l'infection pour la SLDI est inconnue, elle peut être ou ne pas être transmissible</i></p>
Traitement	
<ul style="list-style-type: none"> • Une (1) dose de 2,4 millions d'unités intramusculaire de Bicillin^{MD} L-A. • Administrée par injection en doses de 1,2 million d'unités divisées entre chaque muscle de la hanche (lieu préféré) ou fessier lors de la même visite. • Si vous éprouvez des symptômes de la syphilis tels que des plaies ou des éruptions cutanées, ils devraient disparaître dans les 2 à 4 semaines. • Si les symptômes ne se résorbent pas pendant cette période, consultez votre fournisseur de soins de santé. 	<ul style="list-style-type: none"> • Trois (3) séries d'injections de 2,4 millions d'unités de Bicillin^{MD} L-A, administrées chaque semaine (à intervalle de 7 jours) pendant 3 semaines. • Administrée par injection en doses de 1,2 million d'unités divisées entre chaque muscle de la hanche (lieu préféré) ou fessier lors de la même visite. • Traitement complet = 7,2 millions d'unités sur trois semaines.
Notification du partenaire et suivi	
<ul style="list-style-type: none"> • Tous les contacts sexuels au cours des trois derniers mois précédant le diagnostic ou l'apparition des symptômes doivent être testés pour la syphilis et traités pour une éventuelle infection causée par la syphilis. • Les contacts sexuels datant de plus de trois mois avant le diagnostic ou l'apparition des symptômes peuvent également devoir être testés. 	<p>SYPHILIS LATENTE DE DURÉE INCONNUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tous les contacts sexuels au cours des trois derniers mois précédant le diagnostic doivent être testés pour la syphilis et traités pour une éventuelle causée par la syphilis. • Les contacts sexuels ayant eu lieu entre 3 mois et 1 an avant le diagnostic ne doivent subir qu'un test de dépistage de la syphilis, ou selon les recommandations de l'équipe responsable de la syphilis du BCCDC.

<p align="center">SYPHILIS INFECTIEUSE (Primaire, secondaire, latente précoce)</p>	<p align="center">SYPHILIS LATENTE DE DURÉE INCONNUE (SLDI)* et SYPHILIS LATENTE TARDIVE</p>
<p align="center">Notification du partenaire et suivi (suite)</p>	
	<p><i>SYPHILIS LATENTE TARDIVE</i></p> <p>Les méthodes suivantes sont recommandées pour obtenir un test de dépistage de la syphilis seulement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tous les contacts sexuels à long terme. • Enfants dont le parent gestationnel a un diagnostic de syphilis latente tardive.
<p align="center">Instructions spéciales</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Attendez 1 semaine (7 jours) après votre traitement avant d’avoir des relations sexuelles. • Informez votre fournisseur de soins de santé si vous avez des relations sexuelles avec un partenaire qui n’a pas été traité alors qu’il aurait dû l’être. 	<ul style="list-style-type: none"> • Attendez 1 semaine (7 jours) après avoir débuté le traitement avant d’avoir des relations sexuelles. • Il est très important de compléter les trois semaines entières de traitement pour traiter l’infection et éviter les complications.
<p align="center">Tests sanguins de suivi</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Des recommandations concernant des tests de suivi vous seront faites par votre fournisseur de soins de santé. • Pour la plupart des personnes, cela signifie qu’il faudra répéter le test de la syphilis tous les 3 à 6 mois pendant 2 ans. • Remarque : Votre test de dépistage de la syphilis par méthode EIA (essai immunoenzymatique) demeurera positif (réactif) à vie dans la plupart des cas. Chaque fois que vous vous faites dépister, le laboratoire effectue un deuxième test pour déterminer si vous avez une nouvelle infection ou si vous avez besoin d’un traitement supplémentaire. • Votre fournisseur de soins de santé vous proposera ses recommandations à ce moment-là. 	<ul style="list-style-type: none"> • Des recommandations concernant des tests de suivi vous seront faites par votre fournisseur de soins de santé. • Pour la plupart des personnes, cela signifie qu’il faudra répéter le test de la syphilis tous les 3 à 6 mois pendant 2 ans. • Votre test de dépistage de la syphilis par méthode EIA (essai immunoenzymatique) demeurera positif (réactif) à vie dans la plupart des cas. Des tests sanguins additionnels seront prescrits pour vérifier que l’infection est totalement enrayerée.