



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.2443
Fax 604.707.2441

www.bccdc.ca

Clinical Prevention Services –
STI Control:

604.707.5600
604.707.5604

www.SmartSexResource.com

甲硝唑 Metronidazole

甲硝唑是用于治疗**细菌性阴道炎 (BV)** 或某些性传播感染疾病（如滴虫病）的口服抗生素。

过敏(Allergies)

- 若您对甲硝唑(Flagyl®)过敏，请告知医务人员。

怀孕/哺乳 (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- 只有在与医务人员讨论后，才可在第一孕期（头三个月）以及第二和第三孕期使用甲硝唑。
- 哺乳期间能否使用甲硝唑，取决于处方剂量。如果给您开的是单剂量2克甲硝唑，请在服药后12-24小时挤出母乳丢弃，将药物排出体外。
-

警告 (CAUTION)

-
- 如果您有任何肝脏、血液或神经疾患，请告知医务人员。
- 服药前12小时、治疗期间以及服药后24-48小时内不要饮酒或服用含酒精的药物（如Nyquil®），以防止不良反应（脸红、头痛、恶心、呕吐、痉挛、心跳很快或不均匀、晕厥）。
- 如果您有任何既往存在的心脏病或心律失常，请告知医务人员。
- 服用甲硝唑期间请勿服用以下药物：
 - 抗心律失常药物：决奈达隆 (Multaq®)
 - 抗精神病药：匹莫齐特 (Orap®)、齐拉西酮 (Zeldox®)
 - 戒酒药：双硫仑 (Antabuse®)
 - 艾滋病病毒 (HIV) 药物：洛匹那韦/利托那韦 (Kaletra®) 口服液、替拉那韦 (Aptivus®)
 - 寄生虫治疗：甲苯咪唑 (Vermox®)
 - 口服伤寒疫苗 (Vivotif®)
- 药物相互作用：请注意，本文件不再列出个别药物的相互作用。如果您在服用任何处方药、非处方药、草药或消遣娱乐产品，请与医务人员讨论。

甲硝唑 (续) Metronidazole (cont'd)

副作用 (Side effects)

- 您可能会出现腹泻、恶心、腹痛、呕吐、消化不良、口中有难闻的金属味以及尿色变深。
- 如果您出现任何神经障碍，如癫痫发作、精神错乱、头晕、头痛、乏力、四肢麻木或疼痛，或短暂的视力问题，请立即联系医务人员，不要开车或操作机器。
- 如果您出现过敏或皮肤反应，如皮疹或瘙痒，请立即联系医务人员。

服药说明 (Instructions for Taking)

- 可在饭后服用甲硝唑，减轻胃部不适
- 如果漏服一剂，请在记起来后尽快服用。但是，如果服用下一剂的时间快到了，则跳过漏服的剂量，继续遵照平时的服药时间。不要服双倍剂量。
-

贮存说明 (Storage Instructions)

- 贮存于15-30°C室温下。
- 避光、防高温、防潮。
- 药物超出印明的失效日期，切勿使用。
- 谨防儿童接触。

特殊说明 (Special Instructions)

治疗细菌性阴道炎：

- 如果您是女性，且有女性伴侣，建议您的伴侣接受细菌性阴道炎检查，并在检查结果为阳性时接受治疗。

治疗滴虫病：

- 在未满足下列条件之前，不要进行性生活：
 - 单剂量治疗后已满一周，或您已经完成7天治疗，并且
 - 您的性伴侣也已接受治疗，而且自治疗开始后已经过了一周，即使他们的检测结果为阴性亦需治疗。
- 如果您与未经治疗的伴侣发生性关系，或在您或伴侣的治疗完成之前发生性行为，则需重新治疗。请与医务人员讨论。

如果您有疑问或需要更多信息，请访问
www.smartsexresource.com或联系医务人员。