BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

STI/HIV Services
Clinical Prevention Services
655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

604.707.5600
604.707.5604
bccdc.ca
SmartSexResource.com

페니실린 G 벤자틴(Bicillin® L-A) Penicillin G Benzathine (Bicillin® L-A)

매독 치료용 For Treatment of Syphilis

지속성 페니실린 G 벤자틴(Bicillin® L-A)은 매독용 우선 항생제 치료법입니다. 각 용량에 2 회 근육 주사가 필요하며, 한 번 방문에 좌우 옆 엉덩이(우선 부위)나 엉덩이 근육당 하나씩 주사합니다.

전염성 매독 치료에는 대개 **Bicillin® L-A 240 만 단위 1 회 용량이** 적절합니다. 그러나 감염이 1 년 넘게 또는 알 수 없는 기간 지속한 경우 Bicillin® L-A 240 만 단위 3 회 용량이 필요하며, 이 주사는 3 주에 걸쳐 주 1 회씩 투여합니다.

알레르기(Allergies)

- 다음과 같은 페니실린 또는 세팔로스포린 계통 약품에 알레르기가 있으시면 담당 의료 제공자에게 알려주세요.
  - 예: 페니실린 V-K 및 아목시실린(Amoxil®)
  - 예: 세픽심(Suprax®), 세팔렉신(Keflex®), 세파클로르(Ceclor®)

임신과 수유(Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- 젖을 먹이는 분은 의료 제공자와 상담하시기 바랍니다.
- 임신 중 또는 수유 기간에 매독 진단을 받으면 치료를 받는 것이 매우 중요합니다.
- 임신기에 매독 치료를 받는 중이면 특별 권고 또는 고려 사항을 의료 제공자와 상의하시기 바랍니다.

주의 사항(Caution)

- **약물 상호 작용:** 개개의 약물 상호 작용이 이 문서에 더는 기재되지 않음을 알려드립니다. 처방 약이나 비처방 약, 생약, 레크리에이션 제품을 복용 중이시면 의료 제공자와 상의하시기 바랍니다.

치료 후 자기 관리(Care of Yourself After Treatment)

- Bicillin® L-A 주사 후 클리닉에 15 분간 머무르셔야 합니다.

Last review by BCCDC Pharmacy: January 2026 - Korean

- 치료 후 어떤 반응(예: 발진, 가려움, 호흡 곤란)이든 나타나면 직원에게 즉시 알려주시기 바랍니다.
- 이런 증상이 클리닉을 떠난 후 나타나면 즉시 응급 진료를 받으시기 바랍니다(9-1-1 에 전화하거나 병원 또는 긴급 진료 센터로 가세요).

부작용(Side Effects)

- 주사 부위에 경미한 통증이 일시 있을 수 있습니다.
- 치료 후 설사가 날 수도 있습니다.
- **야리슈-헤르크스하이머 반응(Jarisch-Herxheimer reaction)**(발열이나 오한, 근육통, 두통, 피로)이 나타나는 사람들도 있습니다.
    - 야리슈-헤르크스하이머 반응은 일련의 일시적 부작용으로, 매독 치료 수 시간 후에 나타날 수 있습니다. 이런 반응이 모든 사람에게 나오는 것은 아닙니다.
    - 놀라지 마세요. 이것은 **알레르기 반응이 아니며**, 대개 24 시간 후에 없어집니다.
    - 증상 완화에 필요하다면 아세트아미노펜(Tylenol®)이나 이부프로펜(Advil®)을 복용하세요.
- 이 같은 부작용이 사라지지 않거나 악화되면 의료 제공자에게 연락하시기 바랍니다.

매독의 병기(Stages of Syphilis)

- 치료와 후속 조치 권고 사항은 매독 감염이 신체에 지속한 기간에 따라 다릅니다. 의료 제공자가 감염자에게 매독 몇 기인지 그리고 무슨 치료가 필요한지 알려드립니다. 또한 보건소 간호사가 감염자에게 전화를 걸어 파트너에 대한 후속 조치와 추적 검사 권고 사항을 말씀드리기도 합니다.

궁금한 점이 있거나 정보가 더 필요하시면 www.smartsexresource.com 을 보거나 의료 제공자에게 연락하시기 바랍니다.

SmartSex 자료: 매독

BCCDC 건강 정보: 매독