BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

STI/HIV Services
Clinical Prevention Services
655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

604.707.5600
604.707.5604
bccdc.ca
SmartSexResource.com

苄星青霉素 G (Bicillin® L-A)
治疗梅毒

Penicillin G Benzathine (Bicillin® L-A)
For Treatment of Syphilis

长效苄星青霉素 G (Bicillin® L-A) 是治疗梅毒的首选抗生素。每剂需要肌注两次，在同一次就诊时分别在两侧臀部（首选部位）肌注，每侧一次。

一剂 240 万单位 Bicillin® L-A 通常足以治疗早期梅毒。但是如果感染已超过一年，或感染时间不详，则需要三剂 240 万单位的 Bicillin® L-A；每周一剂，连续三周。

过敏（Allergies）

- 如果您对青霉素类抗生素或头孢菌素类抗生素过敏，请告知医务人员：
  - 如青霉素 V-K 和阿莫西林 (Amoxil®)
  - 如头孢克肟(Suprax®)、头孢氨苄（Keflex®）、头孢克洛（Ceclor®）

怀孕/哺乳（Pregnancy and Chest/Breastfeeding）

- 如果您在哺乳期，请咨询医务人员。
- 如果您在怀孕或哺乳期间被诊断出梅毒，接受治疗是非常重要的。
- 如果您在怀孕期间接受梅毒治疗，请与医务人员讨论是否有任何特殊的建议或需要考虑的事项。

警告（Caution）

- **药物相互作用：**请注意，本文件不再列出个别药物的相互作用。如果您在服用任何处方药、非处方药、草药或消遣娱乐产品，请告知医务人员。

治疗后的护理（Care of Yourself After Treatment）

- 注射完 Bicillin™-LA 后，您需在诊所等候 15 分钟。
- 如果治疗后有任何反应（如皮疹、瘙痒或呼吸困难），请立即通知工作人员。
- 如果离开诊所后出现这些症状，请立即看急诊（拨打 9-1-1 或前往医院或紧急医护中心）

Last review by BCCDC Pharmacy: January 2026 – Simplified Chinese

副作用（Side Effects）

- 注射部位可能会有轻微的暂时性疼痛
- 治疗后您可能会出现腹泻。
- 有些人可能会出现**雅-赫氏反应(Jarisch-Herxheimer reaction)**：发烧、发冷、肌肉疼痛、头痛或疲劳。
  - 雅-赫氏反应是治疗早期梅毒后若干小时内可能出现的一系列暂时性副作用；不过不是每个人都会出现这种反应。
  - 不要惊慌，这**不是过敏反应**，通常会在 24 小时内结束。
  - 如果需要缓解症状，可以服用对乙酰氨基酚 (Tylenol®) 、布洛芬(Advil®)。
- 如果上述任何副作用持续或恶化，请联系医务人员。

梅毒的分期（Stages of Syphilis）

- 对治疗和复诊的建议取决于梅毒感染在您体内存在的时间长短。医务人员会告诉您关于梅毒处于哪个分期阶段以及需要采取的治疗。您可能还会接到代表公共卫生机构的护士打来的电话，讨论伴侣的复诊以及对后续检测的建议。

如果您有疑问或需要更多信息，请访问 www.smartsexresource.com 或联系医务人员。

SmartSex 资源: 梅毒

BCCDC 健康信息: 梅毒