BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

STI/HIV Services
Clinical Prevention Services
655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

604.707.5600
604.707.5604
bccdc.ca
SmartSexResource.com

Penicillin G Benzathine (Bicillin® L-A)
Để Điều Trị Bệnh Giang Mai
Penicillin G Benzathine (Bicillin® L-A)
For Treatment of Syphilis

Penicillin G benzathine tác động dài hạn (Bicillin® L-A) là thuốc trụ sinh (kháng sinh) được ưu tiên dùng để trị bệnh giang mai. Mỗi liều cần được tiêm bắp thịt hai lần, một mũi tiêm vào mỗi cơ hông (chỗ ưu tiên) hoặc cơ mông trong cùng một lần điều trị.

Một liều Bicillin® L-A 2.4 triệu đơn vị thường đủ để điều trị bệnh giang mai sớm. Tuy nhiên, nếu đã nhiễm bệnh hơn một năm, hoặc đã nhiễm trong một thời gian không rõ, thì cần tiêm ba liều Bicillin® L-A 2.4 triệu đơn vị; mỗi tuần một lần trong ba tuần.

Dị Ứng (Allergies)

- Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu quý vị bị dị ứng với penicillins hoặc cephalosporins:
  - thí dụ: penicillin V-K và amoxicillin (Amoxil®)
  - thí dụ: cefixime (Suprax®), cephalexin (Keflex®), cefaclor (Ceclor®)

Thai Nghén và Cho Con Bú/Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- Xin tham khảo với chuyên viên chăm sóc sức khỏe nếu quý vị đang cho con bú/nuôi con bằng sữa mẹ.
- Nếu quý vị được chẩn đoán bị bệnh giang mai trong khi đang có thai hoặc cho con bú/nuôi con bằng sữa mẹ, điều rất quan trọng là phải điều trị cho quý vị.
- Nếu quý vị đang được điều trị bệnh giang mai trong thời gian có thai, xin thảo luận với chuyên viên chăm sóc sức khỏe về bất cứ đề nghị đặc biệt nào.

Chú Ý (Caution)

- **Phản Ứng Giữa Các Loại Thuốc**: Xin lưu ý là tài liệu này không còn liệt kê từng trường hợp phản ứng giữa các loại thuốc. Nếu quý vị đang dùng bất cứ thuốc theo toa, thuốc không cần toa, thảo dược, hoặc các sản phẩm giải trí nào, xin nói chuyện với chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

Tự Chăm Sóc Sau Khi Điều Trị (Care of Yourself Following Treatment)

- Quý vị sẽ được yêu cầu đợi trong phòng điều trị trong 15 phút sau khi tiêm Bicillin® L-A.
- Nếu quý vị có bất cứ phản ứng nào sau khi điều trị (chẳng hạn như da nổi đỏ, ngứa ngáy, hoặc khó thở), xin thông báo ngay cho một nhân viên.
- Nếu các triệu chứng này xảy ra sau khi rời phòng điều trị, xin nhờ cấp cứu y tế ngay (gọi số 9-1-1 hoặc đến trung tâm chăm sóc khẩn cấp).

Last review by BCCDC Pharmacy: January 2026 - Vietnamese

Các Tác Dụng Phụ (Side Effects)

- Quý vị có thể tạm thời bị đau nhẹ, tại chỗ tiêm.
- Quý vị có thể bị tiêu chảy sau khi điều trị.
- **Phản ứng Jarisch-Herxheimer**: sốt, ớn lạnh, đau nhức bắp thịt, nhức đầu, hoặc mệt mỏi.
    - Phản ứng Jarisch-Herxheimer là một tập hợp các tác dụng phụ tạm thời có thể xảy ra trong vòng vài giờ sau khi điều trị bệnh giang mai sớm; mặc dù không phải ai cũng sẽ bị phản ứng này.
    - Đừng hoảng hốt, đây **không phải là phản ứng vì dị ứng** và thường sẽ hết sau 24 giờ.
    - Dùng acetaminophen (Tylenol®), ibuprofen (Advil®), nếu cần để giúp giảm bớt triệu chứng.
- Nếu các tác dụng này vẫn không dứt hoặc trở nặng hơn, xin liên lạc với chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

Các Thời Kỳ của Bệnh Giang Mai (Stages of Syphilis)

- Cách điều trị và các đề nghị tái khám còn tùy theo cơ thể quý vị bị nhiễm giang mai đã bao lâu. Chuyên viên chăm sóc sức khỏe sẽ cho biết quý vị đang bị bệnh giang mai ở thời kỳ nào, và cần loại điều trị nào. Quý vị cũng có thể được y tá của Cơ Quan Sức Khỏe Công Cộng gọi đến để nói chuyện về vấn đề theo dõi bạn tình và đề nghị thử nghiệm tiếp theo.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào hay cần thêm tin tức, xin đến www.smartsexresource.com hoặc liên lạc với chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

Tài Nguyên SmartSex: Giang Mai

Thông Tin Sức Khỏe BCCDC: Giang Mai