



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

Tel 604.707.5600
Fax 604.707.5604

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਮੱਸਿਆਂ (ਐੱਚ.ਪੀ.ਵੀ.) ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ Genital Wart (HPV) Treatment

ਹਿਊਮਨ ਪੈਪੀਲੋਮਾ-ਵਾਇਰਸ (ਐੱਚ.ਪੀ.ਵੀ.) ਕਾਰਣ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਂਝ ਤਾਂ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਮੱਸੇ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਮੱਸਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰੋ।

ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ/ਦੇ ਸਾਥੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਮੁਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਡੋਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਡੋਮ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਐੱਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪ (Treatment Options)

ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਟਾਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ

- ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੱਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ

- ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ: ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ; ਸਫਾ 2 ਦੇਖੋ
- ਬਦਲਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ:
 - ਪੋਡੋਫਾਇਲਿਨ ਲਿਕੁਇਡ (ਪੋਡੋਫਾਇਲਮ 10%), ਸਫਾ 3 ਦੇਖੋ
 - ਟ੍ਰਾਈਕਲੋਰਾਸੈਟਿਕ ਐਸਿਡ (ਟੀ.ਸੀ.ਏ.): ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰੋ

ਖੁਦ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ)

- ਇਮਿਕਿਊਈਮੋਡ 3.75% ਜਾਂ 5% ਕ੍ਰੀਮ (Aldara®P - ਅਲਡਾਰਾ ਪੀ)
- ਸਿਨੇਕੈਟੋਚਿਨਜ਼ (ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੱਤ) 10% ਓਇੰਟਮੈਂਟ (Veregen® - ਵੇਰੇਜੈਨ)
- ਪੋਡੋਫੀਲੋਕਸ 0.5% ਸੌਲਿਊਸ਼ਨ (Condyline® - ਕੌਂਡੀਲਾਈਨ)
- ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰੋ

ਸਾਵਧਾਨ (CAUTION)

ਮੱਸੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਲੀਸਿਕਲਿਕ ਐਸਿਡ (ਕੰਪਾਊਂਡ ਡਬਲਿਊ - Compound W®, ਡਾ. ਸ਼ੋਲਜ਼ - Dr Scholl's®), ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੀ ਟ੍ਰੀ ਓਇਲ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਸਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਮੱਸਿਆਂ (ਐੱਚ.ਪੀ.ਵੀ.) ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਜਾਰੀ) Genital Wart Treatment (cont'd)

ਐੱਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (Information about HPV)

ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਮੇਤ ਹਿਊਮਨ ਪੈਪੀਲੋਮਾ-ਵਾਇਰਸ (ਐੱਚ.ਪੀ.ਵੀ.) ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ **SmartSexResource** (ਸਮਾਰਟ ਸੈਕਸ ਰੀਸੋਰਸ) ਦਾ [ਐੱਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ](#) ਦੇਖੋ।

ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ (ਐੱਲ.ਐੱਨ.2) Cryotherapy with Liquid Nitrogen (LN2)

- ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ (ਐੱਲ.ਐੱਨ.2) ਤਹਿਤ ਗੁਦਾ/ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਪਦਾਰਥ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- **ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: (How it works)**
ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸੋਜਿਸ਼ (ਲਾਲੀ, ਸੋਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਸਿਆਂ (ਐੱਚ.ਪੀ.ਵੀ.) ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- **ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ: (Expected Treatment Response)**
 - 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ
 - 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਿੰਢ ਬਣਨਾ
 - 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਿੰਢ ਝੜ ਜਾਣਾ
- ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 6-8 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 1 ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭਕਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- ਗਰਭਕਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (Side Effects)

- ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲਾਲੀ, ਸੋਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਲਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸਰ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹਲਕਾ (ਹਾਈਪੋ-ਪਿਗਮੈਂਟ) ਜਾਂ ਗੂੜ੍ਹਾ (ਹਾਈਪਰ-ਪਿਗਮੈਂਟ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ

ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਮੱਸਿਆਂ (ਐੱਚ.ਪੀ.ਵੀ.) ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਚਲਦਾ) Genital Wart Treatment (cont'd)

ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ (Recommended Aftercare)

- ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
- ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਵ ਜਾਂ ਵੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਣ ਤਕਲੀਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਕੈਂਚੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਫ਼ੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਰ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

ਪੋਡੋਫਾਇਲਿਨ ਰੇਸਿਨ (ਪੋਡੋਫਾਇਲਮ 10%)

Podophyllin Resin (Podophyllum 10%)

- ਪੋਡੋਫਾਇਲਿਨ ਜੜ੍ਹ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਦਾ/ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: (How it works)
ਪੋਡੋਫਾਇਲਿਨ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤਿਹ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਐੱਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
- ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ: (Expected Treatment Response)
ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ।
- ਪੋਡੋਫਾਇਲਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ 6 ਤਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀ (CAUTION)

- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਡੋਫਾਇਲਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ: ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਮੱਸਿਆਂ (ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੋਨੀ, ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਜੇ ਚਮੜੀ ਸਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੱਸੇ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਰਿਸਦਾ ਹੋਵੇ।

ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਮੱਸਿਆਂ (ਐੱਚ.ਪੀ.ਵੀ.) ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਚਲਦਾ) Genital Wart Treatment (cont'd)

- ਤਿਲ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ 5 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭਕਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ (Pregnancy, Chest/Breastfeeding)

- ਗਰਭਕਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਪੋਡੋਫਾਇਲਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (Side Effects)

- ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਦਰਿਮਾਅਨੇ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲੀ, ਬੇਅਰਾਮੀ, ਸਪਰਸ਼ ਕਾਰਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸੁੰਨਤਾ, ਡੰਗ ਲੱਗਣ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਜਲਣ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣਾ। ਫਾਲੇ, ਫੋੜੇ ਜਾਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਗੜਾਂ ਲੱਗਣ, ਖੂਨ ਵਗਣ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੜਵੱਲ ਪੈਣ ਜਾਂ ਕਬਜ਼, ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਰੀਐਕਸ਼ਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।

ਪੋਡੋਫਾਇਲਿਨ ਰੇਸਿਨ (ਪੋਡੋਫਾਇਲਮ 10%)[Podophyllin Resin (Podophyllum 10%)]

ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ (Recommended Aftercare)

- ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ: ਦਵਾਈ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਪੋਡੋਫਾਇਲਿਨ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ।
- ਪੋਡੋਫਾਇਲਿਨ ਇੱਕ ਕਾਟਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
- ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ: ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਗਰੋਂ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇਤੀ ਧੋਵੋ।
- ਜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਬਰ ਜਲਣ ਹੋਵੇ, ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।
- ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਕੇ ਹਿੱਸੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।
- ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹਾਓ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲਓ।
- ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਵ ਜਾਂ ਵੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਣ ਤਕਲੀਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਕੈਂਚੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ

www.smartsexresource.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।