

性病性淋巴肉芽肿(Lymphogranuloma Venereum, LGV)

性病性淋巴肉芽肿是由衣原体细菌的一个菌株引起的性传播感染。感染通常发生在生殖器区的淋巴系统。这种细菌也可见于体液中，如精液、尿道球腺液、阴道液和肛门液。

LGV可以用抗生素治愈。LGV以往在BC省很少见，但现在变得较为常见，尤其是在与男性有性行为的男性当中。

病因(Causes)

LGV通过阴道、口腔和肛门的性接触传播。这包括插入式性行为和发生体液交换的性活动。共用性玩具也会感染LGV。如果你感染了LGV，即使没有症状，也可能会传染给其他人。

症状(Symptoms)

患LGV而察觉不到任何症状是很常见的。如果有症状，极有可能在性接触后3天到6周出现。LGV可导致发热、疲劳以及生殖器区无痛性溃疡和淋巴肿大。也可导致生殖器脓肿。LGV偶尔可引起关节、肺和肝脏的症状。如果你发生肛交，肛门可能会分泌粘液和出血。

检测和诊断(Tests and Diagnosis)

LGV的诊断可能很复杂，要根据症状、对任何溃疡或肿大的检查以及性生活史。检测通常采用棉签取样和血样进行。

如果你有症状或性伴侣已经检测出LGV阳性，那么你最好接受LGV检测。

治疗(Treatment)

治疗LGV采用处方药抗生素。务必遵照医嘱服用所有药物。如果漏服任何一剂，感染或许无法治愈。如果发生这种情况，或结束治疗后仍有症状，请再去就医。

开始治疗后3周内绝对不能有性行为(用避孕套也不行)。如果在这段时间有性行为，可能会将LGV传给性伴侣，或自己再次感染。如果发生这种情况，请咨询医务人员。

在BC省，治疗LGV所用的药物可免费获得。请向医务人员查询，了解他们有无存货。

性伴侣(Sexual Partners)

如果你被诊断出患有LGV,你在过去两个月内的性伴侣也应该接受检查和治疗。如果过去两个月你没有发生过性行为,则最后一位性伴侣应接受检测和治疗。

告知性伴侣有若干种方式。你可以亲自告知性伴侣或匿名告知。与医务人员讨论哪种方式适合你。

并发症(Complications)

如果你尽早治疗LGV,通常不会有其他健康问题。如果不加治疗,可能会导致严重的并发症,包括:

- 有较高可能感染和传播HIV
- 生殖器和直肠狭窄(闭合)和瘻管(开口)
- 心脏损害、无菌性脑膜炎或眼部炎性疾病

预防(Prevention)

最好定期接受性传播感染检测,如果你有新的性伴侣或处于开放式关系中更是如此。与伴侣讨论安全性行为,确保每个人都知道会有怎样的后果。如果适合你的话,避孕套效果很好。正确使用避孕套可以减少感染和传播LGV的几率。

资料来源(Resources)

SmartSexResource –如果你对LGV感到担心或焦虑

<https://smartsexresource.com/topics/worry-and-anxiety>

TransCareBC – 性别确认方面的性健康和生殖健康信息

<http://www.phsa.ca/transcarebc/care-support/access-care/sexual-hlth>