

梅毒(Syphilis)

梅毒是由梅毒螺旋体引起的性传播感染。梅毒感染分几个阶段：初期、二期、早期潜伏和晚期潜伏。每个阶段都有不同的相关症状。

梅毒的活跃期和非活跃期交替出现。梅毒活跃时，可能会有症状。感染不活跃时，即使仍有梅毒，也不会出现任何症状。

梅毒可以用抗生素治愈。

过去20年，梅毒发病率在BC省一直在上升。目前，梅毒在与男性有性行为的男性当中最为常见。

病因(Causes)

患者通过阴道、口腔和肛门性接触感染梅毒。这包括插入式性行为 and 发生体液交换或皮肤接触的性活动。共用性玩具也可感染梅毒。一旦得了梅毒，即使没有症状，也可能会传染给其他人。在初期、二期和早期潜伏阶段都可能会传播或感染梅毒。

症状(Symptoms)

梅毒感染者通常不会感觉到任何症状。梅毒善于伪装，看起来很像许多其他感染或病症，很容易误诊。

初期阶段：梅毒进入体内的部位可能会出现无痛性溃疡(硬下疳)。溃疡往往不明显，通常发生在性接触后3到90天。溃疡往往出现在生殖器区域，但也可能出现在嘴唇和口腔。溃疡会在数周内自行消失，但梅毒会继续发展。

二期阶段：性接触后14到90天，可能会出现不痒的皮疹。皮疹可出现在身体任何部位，但以胸部、腹部、生殖器、手掌和脚底为最常见。皮疹通常会消失，但几个月后会复发。其他症状可包括头痛、发烧、脱发、淋巴结肿大以及口腔、肛门、阴茎/外生殖器或阴道/内生生殖器内出现肿块或斑块。

潜伏阶段：梅毒如果得不到治疗，就会发展到潜伏阶段。潜伏期可长达30年或更长，在此期间可能没有症状。梅毒潜伏期有两个阶段：潜伏早期(如果一个人在去年感染梅毒)和潜伏晚期。

检测和诊断(Tests and Diagnosis)

通常用血样或用棉签从溃疡(硬下疳)处(如果有溃疡)采样进行检测。

如有以下情况,最好接受梅毒检查:

- 出现相关症状
- 性伴侣检测出梅毒阳性
- 正在接受性传播疾病的常规筛查
- 怀孕

窗口期(测试前等待多长时间):一旦出现症状,大多数用棉签取样进行的检测,结果都是准确的。血液检测在你接触梅毒90天后最准确。在BC省,大多数检测应该在10天内出结果。

治疗(Treatment)

梅毒用处方药抗生素治疗,通常由医务人员注射抗生素。务必遵照医嘱服用所有药物。如果漏服任何一剂,感染或许无法治愈。如果发生这种情况,或结束治疗后仍有症状,请咨询医务人员。

开始治疗后14天内绝对不能有性行为(用避孕套也不行)。如果在这段时间有性行为,可能会将梅毒传给性伴侣,或自己再次感染。如果发生这种情况,请咨询医务人员。

在BC省,治疗梅毒所用的药物可免费获取。请向医务人员查询,了解他们有无存货。如果医务人员没有存药,BC省疾病控制中心可以将药物寄送给他们。

治疗后6个月和12个月进行后续血液检测,然后在2年内每6个月检测一次,确保抗生素治疗有效。如果免疫系统受损,检测会更为频繁。

性伴侣(Sexual Partners)

你在过去3到12个月的性伴侣应该接受梅毒检测和治疗。这将取决于梅毒所处的阶段。

告知性伴侣有若干种方式。你可以亲自告知性伴侣或匿名告知。请与医务人员讨论哪种方式适合你。

并发症(Complications)

如果梅毒得到及早治疗,通常不会有其他健康问题。如果不加治疗,可能会导致严重的并发症,包括:

- 有较高可能感染和传播HIV
- 不孕症
- **晚期:**梅毒不加治疗会对大脑、心脏和身体其他器官造成损害。严重的病例可导致死亡。
- **神经梅毒:**中枢神经系统的感染可发生在任何阶段。症状可包括头痛、头晕、人格改变、平衡问题、痴呆、视力改变、听力丧失、双腿麻木或无力。

怀孕:如果你怀孕了,你应该接受梅毒筛查。你可能会在怀孕和分娩期间将梅毒传给孩子。

预防(Prevention)

最好定期接受性传播感染检测,如果你有新的性伴侣或处于开放式关系中更是如此。与伴侣讨论安全性行为,确保每个人都知会有怎样的后果。如果适合你的话,避孕套效果很好。正确使用避孕套可以减少感染和传播梅毒的几率。

资料来源(Resources)

BC省健康连线 (HealthLink BC) – 梅毒信息的多语言版本

<https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/syphilis>

Syphistory – BC省疾病预防控制中心的梅毒信息网站

<http://syphistory.ca/>

CATIE – 关于梅毒的信息 (加拿大)

<http://www.catie.ca/syphilis>

SmartSexResource – 如果你对梅毒感到担心或焦虑

<https://smartsexresource.com/topics/worry-and-anxiety>

TransCareBC – 性别确认方面的性健康和生殖健康信息

<http://www.phsa.ca/transcarebc/care-support/access-care/sexual-hlth>